

ПЕСТИЦИДЫ

Инсектициды и акарициды

Bacillus thuringiensis, var. kurstaki	10	Диазин Евро	35	Паратион-метил	57
Bacillus thuringiensis, var. thuringiensis	15	Диазинон	32, 34	Парашют	57
Абамектин	18	Диазинон Агро	32	Перметрин	71
Авант	45	Диазинон Экспресс	34	Пикет	22
Аверсектин С	18	Диазинон-600	35	Пиридабен	58
Адифур	45	Диазол	33	Пиримифос-метил	58
Адмирал	60	Диметоат	36, 40	Пиринекс	65
Адонис	64	Диметоат-400	39	Пирипроксифен	60
Аккорд	24	Димилин	41	Полипептид	61
Актара	62	Дитокс	37	Препарат 30	30
Актеллик	58	Дифлубензурон	40	Пропаргит	61
АлгАльф	24	Доктор	62	Простор	57
Алтын	48	Дурсбан	65	Регент	64, 65
Алфос	24	Зета-циперметрин	41	Рогор-С	38
Альтерр	23	Зубр	44	Санмайт	58
Альфас	23	Имидаклоприд	41, 45	Семафор	30
Альфацин	23	Имидж	43	Сера	61
Альфа-циперметрин	22	Имидор	43	Суми-альфа	73
Альфа-Ципи	22	Индоксакарб	45	Сумитион	64
Альфашанс	24	Инсегар	64	Сэмпай	72
Алюминия фосфид	24	Инта-Вир	69, 70	Табу	43
Арриво	67	Инта-Ц-М	71	Тагор	40
Атом	32	Искра	71	Талстар	30
Ацетамиприд	28	Искра Золотая	43	Танрек	41
Банкол	28	Искра М	56	Таран	41
Баргузин	35	Калипсо	62	Тау-флювалинат	62
Баргузин-600	33	Камикадзе	58	Террадим	36
Бенсултап	28	Каратэ Зеон	46	Тефлутрин	62
Бета-циперметрин	28, 40	Карачар	50	Тиаклоприд	62
Бета-цифлутрин	45	Карбосульфат	45	Тиаметоксам	62
Би-58 Новый	36	Карбофуран	45	Тиовит Джет	61
Бикол	17	Катфос	26	Фагот	24
Бином	39	Кемидим	37	Фазис	64
Битиплекс	61	Кемифос	54	ФАС	32, 61
Битоксибациллин	15	Кинмикс	28	Фаскорд	24
Бифентрин	29, 57	Кинфос	40	Фастак	22
Брейк	49	Клима	61	Феназахин	63
Бретер	50	Клипер	29	Фенаксин Плюс	57
Бунчук	51	Командор	44	Фенинтротион	64
Вазелиновое масло	30	Командор Макси	44	Феноксикарб	64
Вантекс 60	31	Конфидор	44	Фипронил	64
Вега	65	Конфидор Экстра	42	Фитоверм	18, 21
Вертимек	18	Корадо	42	Фитоверм-М	21
Вирин-ГСШ	30	Креолин	71	Форс	62
Вирин-ПШМ	30	Креоцид Про	71	Фосбан	65
Вирус гранулеза сибирского шелкопряда	30	Круйзер	63	Фоском	25, 26
Вирус ядерного полиэдроза рыжего соснового пилильщика	30	Кунгфу	49	Фосфин	25
Вирус ядерного полиэдроза шелкопряда монашенки	30	Лепидобактоцид	15	Фумифаст	27
Витрин-Диприон	30	Лепидоцид	10, 11, 12, 14	Фурадан	45
Гамма-цигалотрин	31	Люфенурон	46	Фуфанон	52
Герольд	40	Лямбда-С	48	Фьюри	41
Гладиатор	47	Лямбда-цигалотрин	46	Хинуфур	45
Гром	34	Маврик	62	Хлорпирифос	65
Гром-2	34	Малатион	51, 57, 71	Цезарь	23
Дакфосал	27	Маршал	45	Ципер	68
Данадим	37	Матч	46	Циперметрин	65, 71
Дельтаметрин	31	Медветокс	34	Ципи	68
Демитан	63	Метабром 980	57	Ципи Плюс	65
Депис Профи	31	Метилбромид (бромистый метил)	57	Цунами	23
Депис Экстра	31	Молния	49	Чинук	45
Ди-68	39	Моспилан	28	Шаралфос	27
		Муравьин	35	Шарпей	66
		Мухоед	33	Экзотоксин	15
		Новактион	51	Эсфенвалерат	72
		Омайт	61		

Инсектициды и акарициды

Название, препаративная форма, содержание д.в., регистрант, классы опасности, номер государственной регистрации, ограничения, дата перерегистрации (число, месяц, год)	Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т)	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
1	2	3	4	5	6	7

Bacillus thuringiensis, var. kurstaki (спорово-кристаллический комплекс)

Лепидоцид, П (БА-3000 ЕА/мг) ООО ПО «Сиббиофарм», ВНИИ биохиммашпроект 4/4 01-2012-0817 (100)-1 12.2010	1	Пшеница яровая	Серая зерновая совка (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание в период вегетации при численности не более 20 особей на 100 колосьев	5(1)	-(1)
	0,5-1	Капуста и другие овощные	Капустная и репная белянки, капустная моль, огневки (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней	5(1-2)	5(1)
	1,5-2		Капустная совка (гусеницы 1-2 возраста)		5(2)	
	0,5-1	Яблоня, слива, абрикос, черешня, груша, вишня	Яблонная и плодовые моли (гусеницы 1-3 возраста)		5(1-2)	
	1	Яблоня, слива, абрикос, черешня, груша, вишня, декоративные древесные породы	Американская белая бабочка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней	5(1-3)	
	1-1,5		Златогузка, пяденицы, листовертки весенней группы, шелкопряды (гусеницы 1-3 возраста)			
	2-3	Яблоня	Яблонная плодоярка			Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней
	1-1,5	Смородина, малина, рябина черноплодная, крыжовник, земляника	Листовертки, крыжовниковая огневка (гусеницы 1-3 возраста), крыжовниковый пилильщик	Погружение клубней перед закладкой на хранение в 1%-й рабочий раствор. Расход - 100 л/15 т клубней	-(1)	-(-)
	0,6-1	Свекла сахарная, столовая, кормовая, люцерна, капуста, подсолнечник, морковь	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)			
	0,7	Картофель	Картофельная моль	Опрыскивание в период вегетации через 8-10 дней после начала лета бабочек против каждого поколения вредителя с интервалом 5-7 дней	5(1-2)	5(1)
	2-3	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации	5(1)	
	0,5	Шалфей мускатный	Шалфейная и озимая совки, совка-гамма (гусеницы 1-2 возраста)			
1	Амми зубная	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)				
	Бессмертник песчаный	Репейница (гусеницы 1-4 возраста)				
	Валериана лекарственная	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)				
1,2	Желтушник раскидистый	Капустная моль, совки (гусеницы 1-3 возраста)				
	Ноготки лекарственные	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста), совки (гусеницы 1-4 возраста)				
	Фенхель	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)				

1	2	3	4	5	6	7	
		Стальник полевой	Стальниковая и люцерновая совки (гусеницы 1-3 возраста)		5(2)		
		Ромашка аптечная	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)				
	1,5	Ревень тангутский, паслен дольчатый	Озимая совка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в фазе 2-3 настоящих листьев	5(1-2)		
		Роза эфиромасличная	Пяденицы, листовертки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период распускания листьев			
	2	Шиповник	Листовертки, златогузка, шелкопряды (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации	5(1)	-(1)	
	0,8-1 (А)	Дуб	Златогузка (гусеницы 2-3 возраста), зеленая дубовая листовертка (гусеницы 1-2 возраста)		-(1)		
	0,5 (А)		Кольчатый шелкопряд (гусеницы 1-2 возраста)				
	0,8-1 (А)	Дуб, береза	Непарный шелкопряд (гусеницы 1-2 возраста)		5(2)	5(1)	
	0,8 (А)	Дуб и другие лиственные	Пяденицы зимняя и обдирало (гусеницы 1-2 возраста)				
	1-1,1	Черемуха, яблоня	Горностаевые моли (гусеницы 1-2 возраста)				
	1-1,2 (А)	Сосна	Сосновый шелкопряд (гусеницы 1-3 возраста)				
	1-1,5 (А)		Шелкопряд монашенка (гусеницы 1-2 возраста)				
	1 (А)		Сосновая пяденица, сосновая совка (гусеницы 1-2 возраста)				
	1-1,5	Городские зеленые насаждения	Летне-осенний комплекс чешуекрылых вредителей (гусеницы 1-3 возраста)				
	20-30 г/10 л воды (Л)	Капуста, свекла, морковь	Капустная и репная белянки, капустная моль, огневки, луговой мотылек, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней	5(2)	5(1)	
		Яблоня	Яблонная плодоярка	Опрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	5(1-3)		
		Плодовые культуры	Яблонная и плодовая моли, златогузка, боярышница, листовертки, американская белая бабочка, шелкопряды, пяденицы	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	5(2)		
		Смородина, земляника, крыжовник, рябина черноплодная	Смородинная листовертка, крыжовниковая огневка, пяденицы (гусеницы 1-3 возраста), пилильщики				
		Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход - от 2 до 5 л на куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)			
		Роза эфиромасличная	Пяденицы, листовертки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней			
		Лекарственные культуры	Листовертки, моль, златогузка, луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)				
Лепидоцид, ТАБ (БА-3000 ЕА/мг) ООО ПО	2-3 г (4-6 таб.)/л воды (Л)	Капуста, свекла столовая и кормовая, морковь и	Капустная и репная белянки, капустная моль, огневки, луговой мотылек, капустная	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход - 1 л/10 м²	5(1-2)	2(1)	

Инсектициды

1	2	3	4	5	6	7
«Сиббиофарм» 4/4 01-962-0817-1 12.2010		другие овощные культуры	совка (гусеницы 1-3 возраста)			
		Яблоня, слива, абрикос, черешня, груша, вишня	Яблонная и плодовая моли, златогузка, боярышница, листовертки, американская белая бабочка, шелкопряды, пяденицы	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)		
		Яблоня	Яблонная плодовая жорка	Опрыскивание в период массового отрождения гусениц через 10-14 дней против каждого поколения вредителя. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	5(2)	1(1)
		Смородина, малина, земляника, крыжовник, рябина черноплодная	Листовертки, крыжовниковая огневка (гусеницы 1-3 возраста), пяденицы, пилильщики	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-8 дней. Расход - 1 л/10 м ²	5(1-2)	2(1)
		Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход - от 2 до 5 л на куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)		
		Лекарственные культуры	Листовертки, моль, златогузка, луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход - 0,2 л/м ²	10(1-2)	
		Роза эфиромасличная	Пяденицы, листовертки (гусеницы 1-3 возраста)			
Лепидоцид, СК (БА-2000 ЕА/мг) ООО ПО «Сиббиофарм» 4/4 01-602-0817-1 12.2010	1	Пшеница яровая	Серая зерновая совка (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание в период вегетации при численности не более 20 особей на 100 колосьев	5(1)	-(1)
	0,5-1	Капуста и другие овощные	Капустная и репная белянки, капустная моль, огневки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней	5(1-2)	5(1)
	1,5-2		Капустная совка (гусеницы 1-3 возраста)		5(2)	
	0,5-1	Яблоня, слива, абрикос, черешня, груша, вишня	Яблонная и плодовая моли (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	5(1-2)	
	1	Яблоня, слива, абрикос, черешня, груша, вишня, декоративные древесные породы	Американская белая бабочка (гусеницы 1-3 возраста)			
	1-1,5		Златогузка, пяденицы, листовертки весенней группы, шелкопряды (гусеницы 1-3 возраста)			
	2-3	Яблоня	Яблонная плодовая жорка	Опрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	5(1-3)	
	1-1,5	Смородина, малина, рябина черноплодная, крыжовник, земляника	Листовертки, крыжовниковая огневка, пяденицы (гусеницы 1-3 возраста), крыжовниковый пилильщик	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней	5(1-2)	
	1	Свекла сахарная, столовая, кормовая, люцерна, подсолнечник, морковь, капуста	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)			
		Картофель	Картофельная моль	Погружение клубней перед закладкой на хранение в 1%-й рабочий раствор. Расход - 100 л/15 т клубней	-(1)	-(1)
	2-3	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации через 8-10 дней после начала лета бабочек, 1-2 обработки через 5-7 дней против каждого поколения вредителя	5(1-2)	5(1)
	0,5	Шалфей мускатный	Шалфейная и озимая совки, совка-гамма (гусеницы 1-2	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с		

1	2	3	4	5	6	7
			возраста)	интервалом 7-8 дней		
	1	Амми зубная	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации	5(1)	
		Бессмертник песчаный	Репейница (гусеницы 1-4 возраста)			
		Валериана лекарственная	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)			
	1,2	Желтушник раскидистый	Капустная моль, совки (гусеницы 1-3 возраста)			
		Ноготки лекарственные	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста), совки (гусеницы 1-4 возраста)			
		Фенхель	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)			
		Стальник полевой	Стальниковая и люцерновая совки (гусеницы 1-3 возраста)			
		Ромашка аптечная	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)		5(2)	
	1,5	Ревень тангутский, паслен дольчатый	Озимая совка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в фазе 2-3 настоящих листьев		
		Роза эфиромасличная	Пяденицы, листовертки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период распускания листьев	5(1-2)	
	2	Шиповник	Листовертки, златогузка, шелкопряды (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации	5(1)	-(1-2)
	3 (А)	Дуб	Златогузка, зеленая дубовая листовертка, кольчатый шелкопряд (гусеницы 1-3 возраста)			
		Дуб, береза	Непарный шелкопряд (гусеницы 1-3 возраста)			
		Дуб и другие лиственные	Пяденицы зимняя и обдирало (гусеницы 1-3 возраста)			
		Сосна	Сосновый шелкопряд, шелкопряд монашенка, сосновая пяденица, сосновая совка (гусеницы 1-3 возраста)			
		Пихта, кедр, лиственница	Сибирский шелкопряд (гусеницы 1-3 возраста)			
		Пихта	Пихтовая пяденица			
	3	Черемуха, яблоня	Горностаевые моли (гусеницы 1-2 возраста)			
		Городские зеленые насаждения	Летне-осенний комплекс чешуекрылых вредителей (гусеницы 1-3 возраста)			
	20-30 г/10 л воды (Л)	Капуста, свекла, морковь	Капустная и репная белянки, капустная моль, огневки, луговой мотылек, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход - 0,5-1,0 л/10 м ²	5(2)	5(1)
		Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней	5(1-3)	
		Плодовые культуры	Яблонная и плодовая моли, златогузка, боярышница, листовертки, американская белая бабочка, шелкопряды, пяденицы	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	5(2)	
		Смородина, земляника, крыжовник, рябина черноплодная	Смородинная листовертка, крыжовниковая огневка, пяденицы (гусеницы 1-3 возраста), пилильщики	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход - 2-10 л/10 м ²		
		Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход - от 2 до 5 л на куст (в зависимости от возраста)		

1	2	3	4	5	6	7
				и типа формировки куста)		
		Роза эфиромасличная	Пяденицы, листовертки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход - 2-10 л/10 м ²		
		Лекарственные культуры	Листовертки, моль, златогузка, луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)			
Лепидоцид СК-М, СК (БА-2000 ЕА/мг) ООО ПО «Сиббиофарм» 4/4 01-2434-0817-1 12.2010	1	Пшеница яровая	Серая зерновая совка (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание в период вегетации при численности не более 20 особей на 100 колосьев	5(1)	-(1)
	0,5-1	Капуста и другие овощные	Капустная и репная белянки, капустная моль, огневки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней	5(1-2)	5(1)
	1,5-2		Капустная совка (гусеницы 1-3 возраста)		5(2)	
	0,5-1	Яблоня, слива, абрикос, черешня, груша, вишня	Яблонная и плодовые моли (гусеницы 1-3 возраста)		5(1-2)	
	1	Яблоня, слива, абрикос, черешня, груша, вишня,	Американская белая бабочка (гусеницы 1-3 возраста)			
	1-1,5	декоративные древесные породы	Златогузка, пяденицы, листовертки весенней группы, шелкопряды (гусеницы 1-3 возраста)			
	2-3	Яблоня	Яблонная плодоярка	Опрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней	5(1-3)	
	1-1,5	Смородина, малина, рябина черноплодная, крыжовник, земляника	Листовертки, крыжовниковая огневка, пяденицы (гусеницы 1-3 возраста), крыжовниковый пилильщик	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней	5(1-2)	
	1	Свекла сахарная, столовая, кормовая, люцерна, подсолнечник, морковь, капуста	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)			
		Картофель	Картофельная моль	Погружение клубней перед закладкой на хранение в 1%-й рабочий раствор. Расход - 100 л/15 т клубней	-(1)	-(1)
	2-3	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации через 8-10 дней после начала лета бабочек, 1-2 обработки через 5-7 дней против каждого поколения вредителя	5(1-2)	5(1)
	0,5	Шалфей мускатный	Шалфейная и озимая совки, совка-гамма (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней		
	1	Амми зубная	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации	5(1)	
		Бессмертник песчаный	Репейница (гусеницы 1-4 возраста)			
		Валериана лекарственная	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)			
	1,2	Желтушник раскидистый	Капустная моль, совки (гусеницы 1-3 возраста)			
Ноготки лекарственные		Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста), совки (гусеницы 1-4 возраста)				
Фенхель		Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)				
Стальник полевой		Стальниковая и люцерновая совки (гусеницы 1-3 возраста)				
	Ромашка аптечная	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)		5(2)		
1,5	Ревень тангут-	Озимая совка (гусеницы	Опрыскивание в фазе 2-3 настоящих			

1	2	3	4	5	6	7
		ский, паслен дольчатый	1-3 возраста)	листьев		
		Роза эфиромасличная	Пяденицы, листовертки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период распускания листьев	5(1-2)	
	2	Шиповник	Листовертки, златогузка, шелкопряды (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации	5(1)	
	3 (А)	Дуб	Златогузка, зеленая дубовая листовертка, кольчатый шелкопряд (гусеницы 1-3 возраста)		-(1-2)	
		Дуб, береза	Непарный шелкопряд (гусеницы 1-3 возраста)			
		Дуб и другие лиственные	Пяденицы зимняя и обдирало (гусеницы 1-3 возраста)			
		Сосна	Сосновый шелкопряд, шелкопряд монашенка, сосновая пяденица, сосновая совка (гусеницы 1-3 возраста)			
		Пихта, кедр, лиственница	Сибирский шелкопряд (гусеницы 1-3 возраста)			
		Пихта	Пихтовая пяденица			
	3	Черемуха, яблоня	Горностаевые моли (гусеницы 1-2 возраста)			
		Городские зеленые насаждения	Летне-осенний комплекс чешуекрылых вредителей (гусеницы 1-3 возраста)			
	20-30 г/10 л воды (Л)	Капуста, свекла, морковь	Капустная и репная белянки, капустная моль, огневки, луговой мотылек, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход - 0,5-1,0 л/10 м²	5(2)	5(1)
		Яблоня	Яблонная плодовая	Опрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	5(1-3)	
		Плодовые культуры	Яблонная и плодовые моли, златогузка, боярышница, листовертки, американская белая бабочка, пяденицы, шелкопряды	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход - 2-10 л/10 м²	5(2)	
		Смородина, земляника, крыжовник, рябина черноплодная	Смородинная листовертка, крыжовниковая огневка, пяденицы (гусеницы 1-3 возраста), пилильщики	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход - от 2 до 5 л на куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)		
		Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход - от 2 до 5 л на куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)		
		Роза эфиромасличная	Пяденицы, листовертки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней		
		Лекарственные культуры	Листовертки, моль, златогузка, луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)			
Лепидобактоцид, Ж (БА-2000 ЕА/г) НПП «Экосервис С» 4/4 01-2147-0202-0 12.2014	2-3 (А)	Лиственные и хвойные породы	Хвое- и листогрызущие вредители (гусеницы младших возрастов)	Авиационное опрыскивание в период вегетации	1(1)	1(1)
	3 (А)			Аэрозольное опрыскивание в период вегетации с шириной захвата не более 0,3 км		
	2	Виноград	Гроздевая листовертка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации		
	8 (А)	Можжевельник	Южная можжевельниковая моль			
	2-3 (А)	Хвойные породы	Хвоегрызущие вредители (гусеницы младших возрастов)	Авиационное опрыскивание в период вегетации		
Bacillus thuringiensis, var. thuringiensis, экзотоксин (спорово-кристаллический комплекс)						
Битоксибациллин, П (БА-1500 ЕА/мг) ВНИИСМ,	2	Овощные культуры	Капустная совка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней	5(1-3)	5(1)
	1-1,5		Капустная и репная белянки, капустная моль, огневки			

1	2	3	4	5	6	7
ООО ПО «Сиббиофарм» 2/4 01-707- 0817(107)-1 12.2010	2-5	Картофель, томаты, баклажаны, перцы	Колорадский жук	Опрыскивание при массовом отрождении личинок против каждого поколения вредителя с интервалом 6-8 дней	5(2-3)	
	2-3	Яблоня, слива, абрикос, шелковица, груша, вишня, черешня	Яблонная и плодовая моли, боярышница, американская белая бабочка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней	5(1-2)	
	3-5		Листовертки, шелкопряды, пяденицы, златогузка (гусеницы 1-3 возраста)			
	21-30	Огурцы защищенного грунта	Паутинный клещ	Многokратное опрыскивание в период вегетации 0,7-1%-м рабочим раствором с интервалом 15-17 дней	3(-)	1(-)
	2	Свекла сахарная, столовая, кормовая, люцерна, подсолнечник, морковь, капуста	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней	5(1-2)	5(1)
		Свекла сахарная	Матовый мертвoед	Опрыскивание в период массового отрождения личинок при численности более 2 экз./м² против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней		
	6-8	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание через 8-10 дней после начала лета бабочек против каждого поколения вредителя с интервалом 5-7 дней	5(2)	
	5	Смородина, крыжовник	Листовертки, крыжовниковая огневка, пяденицы (гусеницы 1-3 возраста), пилильщики, листовая галлица, паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Против клеща многократные обработки с интервалом 15-17 дней		
	2-4	Хмель	Хмелевая тля	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 8 дней		
	2-3		Листогрызущие совки, стеблевой и луговой мотыльки (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней		
	2,5-3	Люцерна (семенные посевы)	Люцерновый клоп (личинки 3-4 возраста)	Опрыскивание в период цветения с интервалом 10 дней	-1(2)	-1(1)
	5		Люцерновая совка (гусеницы младших возрастов)		-2(2)	
				Пяденицы (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание в период вегетации	
	6 мл/м²	Незагруженные складские помещения	Вредители запасов	Обработка влажным способом, расход - 0,2 л/м². Допуск людей и загрузка складов через 24 часа после обработки	1(1)	1(1)
	2	Шалфей мускатный	Шалфейная и озимая совки, совка-гамма (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней	5(1-3)	5(1)
	2-3	Амми зубная	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации	5(1)	
		Бессмертник песчаный	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста), репейница (гусеницы 1-4 возраста)			
		Мачек желтый	Шовный листоед (личинки 1-2 возраста)			
	3	Роза эфиромасличная	Пяденицы, листовертки (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период распускания листьев	10(1)	5(1-2)
		Кенаф	Озимая и хлопковая совки (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации		
		Желтушник раскидистый	Капустная моль, совки (гусеницы 1-3 возраста)			
		Ноготки лекарственные, фенхель	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)			
		Стальник полевой	Стальниковая и люцерновая совки (гусеницы 1-3 возраста)			

1	2	3	4	5	6	7
		Ревень тангутский, паслен дольчатый	Подгрызающие совки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в фазе 1-2 настоящих листьев	5(2)	
		Ромашка аптечная	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации	5(1)	
		Шиповник	Листовертки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в фазе отрастания побегов - бутонизации		
	2 (А)	Дуб	Златогузка (гусеницы 2-3 возраста), пяденицы зимняя и обдирало (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации		
	2-2,5 (А)	Береза	Непарный шелкопряд, летне-осенний комплекс чешуекрылых вредителей (гусеницы 1-2 возраста)			
	1-1,5 (А)	Дуб	Непарный шелкопряд (гусеницы 1-2 возраста)			
	40-100 г/10 л воды (Л)	Картофель, томаты, баклажаны, перцы	Колорадский жук	Опрыскивание при появлении личинок 1-2 возраста. 3 обработки на картофеле и 4 - на других культурах. Интервал между обработками при среднесуточной температуре выше 20°C - 6-7 дней, ниже 20°C - 8-10 дней	5(2-4)	5(1)
	40-80 г/10 л воды (Л)	Яблоня, слива, абрикос, шелковица, груша, вишня, черешня, декоративные древесные породы	Яблонная и плодовая моли, яблонная плодожорка, боярышница, листовертки, американская белая бабочка, шелкопряды, пяденицы (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Во время цветения обработки запрещены. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	5(1-2)	
	80-100 г/10 л воды (Л)	Огурцы защищенного грунта	Паутинный клещ	Многочасовое опрыскивание в период вегетации с интервалом 15-17 дней	3(-)	1(-)
	40-50 г/10 л воды (Л)	Капуста, морковь, свекла	Капустная совка, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней	5(1-2)	5(1)
	60-80 г/10 л воды (Л)	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание через 8-10 дней после начала лета бабочек против каждого поколения вредителя с интервалом 5-7 дней. Расход - от 2 до 5 л на куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)		
	80-100 г/10 л воды (Л)	Смородина, крыжовник	Листовертки, крыжовниковая огневка, пяденицы (гусеницы 1-3 возраста), пилильщики, листовая галлица, паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней		
	40-50 г/10 л воды (Л)	Хмель	Хмелевая тля, листогрызущие совки, стеблевой и луговой мотыльки		5(2)	
	50-70 г/10 л воды (Л)	Лекарственные культуры	Листовертки, моли, совки, луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание против каждого поколения вредителей с интервалом 6-10 дней	10(2)	
	1	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная моль, огневки	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней	5(2)	5(1)
	1,5		Капустная совка (гусеницы 1-2 возраста)			
(Р) Бикол, СП (титр не менее 45 млрд спор/г, БА-2000 ЕА/г) ООО ВОИ «Биоин» 2/1 01-0579-0096-0 12.2012	2-5	Картофель, томаты, баклажаны, перцы	Колорадский жук	Опрыскивание при массовом отрождении личинок против каждого поколения вредителя с интервалом 6-8 дней		
	14-21	Огурцы защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации 0,7%-м рабочим раствором с интервалом 15-17 дней. Расход 2000-3000 л/га	3(3)	3(-)
	1	Яблоня	Моли, боярышница, американская белая бабочка (гусеницы 1-3 возраста), шелкопряды	Опрыскивание в период вегетации 0,6-1%-м рабочим раствором в фазе «розовый бутон» и сразу после цветения	5(2)	5(1)

1	2	3	4	5	6	7
	20 г/10 л воды (Л)	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная моль, огневки	Опрыскивание через 7-8 дней против каждого поколения вредителя	5(2)	5(2)
	30 г/10 л воды (Л)		Капустная совка	Опрыскивание через 7-8 дней против гусениц 1-2-го возрастов каждого поколения вредителя		
	70-160 г/10 л воды (Л)	Картофель, томаты, баклажаны, перцы	Колорадский жук	Опрыскивание через 6-8 дней при массовом отрождении личинок каждого поколения вредителя	5(3)	
	70 г/10 л воды (Л)	Огурцы защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание с интервалом 15-17 дней 1%-м рабочим раствором	3(3)	3(-)
	60-160 г/10 л воды (Л)	Яблоня	Моли, боярышница, американская белая бабочка (гусеницы 1-3-го возраста), шелкопряды	Опрыскивание в фазе «розовых бутонов», 2-е - сразу после цветения	5(2)	

Абамектин

Вертимек, КЭ (18 г/л) ООО «Сингента» 2/1 0060-06-101-018-0-0-1-0 0060-06-101-018-0-0-1-0/01 12.2015	1-1,5	Цветочные культуры защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 9 дней	3(3)	3(-)
	1-1,2	Огурцы защищенного грунта	Паутинный клещ, табачный и оранжерейный трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	
	0,8-1		Паутинный клещ		3(2)	
	0,8-1,2	Перцы, баклажаны, томаты защищенного грунта				
	0,5-1,5	Цветочные культуры открытого грунта		Опрыскивание в период вегетации в концентрации - 0,05%. Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л / га	3(3)	
	0,5	Горшечные культуры защищенного грунта	Обыкновенный паутинный клещ, западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации в концентрации - 0,05%. Расход рабочей жидкости - 1000 л / га		

Аверсектин С

Фитоверм, КЭ (2 г/л) ООО НБЦ «Фарм-биомед» 3/2 01-0617-0111-1 12.2013	1,6	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации 0,4%-м рабочим раствором	2(1-2)	2(1)
	2,4	Белокочанная капуста	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации 0,4%-м рабочим раствором с интервалом в 14-20 дней	2(2-3)	
	1,2	Смородина	Клещи	Опрыскивание в период вегетации 0,2%-м рабочим раствором	2(2)	2(1)
	0,8-1		Пяденицы, листовертки	Опрыскивание в период вегетации 0,15%-м рабочим раствором		
	0,9	Яблоня	Паутинный и красный плодовые клещи, клещ Шлехтендаля, розанная, всеядная, сетчатая, ивовая кривоусая листовертки, бурополосая пяденица			
	2		Яблонная плодовая жук, совки	Опрыскивание в период вегетации 0,2%-м рабочим раствором		
	0,3-0,4	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации 0,1%-м рабочим раствором с интервалом 20 дней	1(1-2)	1(-)
	0,8		Картофельная коровка	Опрыскивание в период вегетации 0,2%-м рабочим раствором с интервалом 7-14 дней	2(2-3)	
	1-3	Огурцы, перцы, баклажаны защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации 0,1%-м рабочим раствором с интервалом 20 дней	2(2)	2(-)
	8-24		Персиковая, бахчевая тли	Опрыскивание в период вегетации 0,8%-м рабочим раствором с интервалом 15 дней	2(2-3)	3(-)
	10-30		Табачный, западный цветочный трипсы	Опрыскивание в период вегетации 1%-м рабочим раствором с интервалом 20 дней		
	1-3	Томаты защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации 0,1%-м рабочим раствором с интервалом 20 дней	3(2-3)	
	8-24		Персиковая, бахчевая тли	Опрыскивание в период вегетации 0,8%-м рабочим раствором с интервалом 15 дней		

1	2	3	4	5	6	7
	10-30		Табачный, западный цветочный трипсы	Опрыскивание в период вегетации 1%-м рабочим раствором с интервалом 20 дней		
	3-4	Розы защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации 0,2%-м рабочим раствором с интервалом 20 дней	2(2-3)	2(-)
	6-12		Зеленая розанная тля	Опрыскивание вегетирующих растений 0,4%-м рабочим раствором с интервалом 14-16 дней		
	12-15		Западный цветочный трипс	Опрыскивание растений в период цветения 0,8%-м рабочим раствором с интервалом 7 дней		
	1,5-2	Хмель	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации 0,2%-м рабочим раствором с интервалом 14 дней		2(1)
	1 мл/л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации 0,1%-м рабочим раствором с интервалом 20 дней. Расход - 5 л/100 м²	1(1-3)	1(-)
	4 мл/л воды (Л)	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации 0,4%-м рабочим раствором. Расход - 4 л/100 м²	2(1-2)	2(1)
	2 мл/л воды (Л)	Смородина	Клещи	Опрыскивание в период вегетации 0,2%-м рабочим раствором. Расход - 1 л на куст	2(2)	
	1,5 мл/л воды (Л)		Пяденицы, листовертки	Опрыскивание в период вегетации 0,15%-м рабочим раствором. Расход - 1 л на куст		
		Яблоня	Паутинный и красный плодовые клещи, клещ Шлехтендала, розанная, всеядная, сетчатая, ивовая кривоусая листовертки, бурополосая пяденица	Опрыскивание в период вегетации 0,15%-м рабочим раствором. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)		
	2 мл/л воды (Л)		Яблонная плодожорка, совки	Опрыскивание в период вегетации 0,2%-м рабочим раствором. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	2(1)	
	1 мл/л воды (Л)	Огурцы, перцы, баклажаны защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации 0,1%-м рабочим раствором с интервалом 20 дней. Расход - 10 л/100 м²	2(2)	2(-)
	4-6 мл/л воды (Л)		Персиковая, бахчевая тли	Опрыскивание в период вегетации 0,8%-м рабочим раствором с интервалом 15 дней. Расход - 10 л/100 м²	2(2-3)	
	10 мл/л воды (Л)		Табачный, западный цветочный трипсы	Опрыскивание в период вегетации 1%-м рабочим раствором с интервалом 20 дней. Расход - 10 л/100 м²		
	1 мл/л воды (Л)	Томаты защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации 0,1%-м рабочим раствором с интервалом 20 дней. Расход - 10 л/100 м²	3(2-3)	3(-)
	4-6 мл/л воды (Л)		Персиковая, бахчевая тли	Опрыскивание в период вегетации 0,8%-м рабочим раствором с интервалом 15 дней. Расход - 10 л/100 м²		
	10 мл/л воды (Л)		Табачный, западный цветочный трипсы	Опрыскивание в период вегетации 1%-м рабочим раствором с интервалом 20 дней. Расход - 10 л/100 м²		
	2 мл/л воды (Л)	Цветочные культуры защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации, 0,2%-м рабочим раствором с интервалом не менее 20 дней. Расход - 10 л/100 м²	2(2-3)	2(1)
	4 мл/л воды (Л)		Зеленая розанная тля	Опрыскивание вегетирующих растений 0,4%-м рабочим раствором с интервалом 14-16 дней. Расход - 10 л/100 м²		
	8 мл/л воды (Л)		Калифорнийский трипс	Опрыскивание растений в период цветения 0,8%-м рабочим раствором, последовательные обработки с интервалом 7 дней. Расход - 10 л/100 м²		

1	2	3	4	5	6	7
	2 мл/л воды (Л)	Комнатные растения	Паутинный клещ	Опрыскивание растений по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней. Расход - 0,1-0,2 л/м²	2(2-4)	1(-)
	2 мл/0,25 л воды (Л)		Тли			
	2 мл/0,2 л воды (Л)		Трипсы			
	2 мл/л воды (Л)	Цветочные культуры открытого грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание растений по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней. Расход - 10 л/100 м²		
	2 мл/0,25 л воды (Л)		Тли			
	2 мл/0,2 л воды (Л)		Трипсы			
	2 мл/л воды (Л)	Каштан конский	Клещи	Опрыскивание в период вегетации 0,2%-м рабочим раствором	1(1-3)	
		Ирга	Смородиновая листовертка			
		Аристолохия	Паутинный клещ			
		Рябина черноплодная	Зеленая тля, рябиновая пло- дожорка, паутинный клещ			
		Барбарис	Барбарисовая тля, цветочная пяденица			
		Карагана	Акациевая тля			
		Свидина	Тли, запятовидная щитовка			
		Кизильник	Тли			
		Боярышник	Боярышниковый клещ			
		Ракитник	Ракитниковая пяденица			
		Бересклет	Тли, бересклетовая щитовка			
		Дрок	Садовая совка, дроковая тля			
		Плющ	Непарный западный короед			
		Бобовник	Пяденица хвостатая, трост- никовая тля, паутинный клещ			
		Бирючина	Жимолостная лопастная пяденица, совка пирамидаль- ная, бирючиновая галлица, тли			
		Жимолость	Пяденицы, пилильщики, тли, щитовки, ложнощитовки			
		Чубушник	Паутинный клещ, бобовая тля			
		Тополь	Тли, тополевая пяденица			
		Миндаль	Тли, листовертки			
Черемуха		Тли, черемуховая листоверт- ка, черемуховая минирующая моль				
Груша		Листовертки, клещи, долго- носики, тли				
Дуб		Дубовый блошак, плодовая чехликовая моль, зеленая дубовая листовертка, дубо- вый большой и дубовый малый усачи				
Рододендрон		Паутинный клещ				
Робиния		Акациевый клещ				
Роза		Паутинный клещ, тли				
Малина, ежевика		Клещи, тли, листовертки				
Ива		Ивовая листовертка				
Бузина		Бузиновая хвостатая пядени- ца, бузиновый лиственный клещ				
Рябина		Рябиновая тля, пяденицы, щитовки				
Спирея		Сиреневая тля, свекловичная тля				
Сирень		Сиреневая пяденица				
Липа		Шелкопряды, бражники, моли, пяденицы, листоверт- ки, галловые клещи, совки				
Вяз		Листовертки, пяденицы, галловые тли				

1	2	3	4	5	6	7
		Калина	Калиновая тля			
		Вейгела	Тли			
		Пихта	Пихтовая корьевая тля			
		Можжевельник	Пяденица можжевельниковая, тли			
		Туя	Туевые тли			
Фитоверм, КЭ (10 г/л) ООО НБЦ «Фармбиомед» 3/2 01-2015-0111-1 12.2013	0,06-0,08	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней	2(1-3)	2(1)
	0,2-0,3	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации		
	0,18-0,24	Смородина	Клещи		2(2)	
			Пяденицы, листовертки		2(1)	
		Яблоня	Паутинный и красный плодовой клещ, клещ Шлехтендаля, розанная, всеядная, сетчатая, ивовая кривоусая листовертки, бурополосая пяденица			
	0,4-0,8		Яблонная плодоярка, совки			
	0,2-0,6	Томаты, огурцы, перцы, баклажаны защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней	2 (многократно)	
	1,6-4,8		Тли персиковая, бахчевая	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней		
	2-6		Табачный, западный цветочный трипсы	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней		
	0,6-0,8	Розы защищенного грунта	Паутинный клещ			
	1,2-2,4		Зеленая розанная тля	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 - 16 дней		
	2,4-3		Западный цветочный трипс	Опрыскивание в период цветения с интервалом 7 дней	2(2-3)	
	2 мл/10 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней. Расход - 5 л/100 м ²	2(1-3)	2(1)
	8 мл/10 л воды (Л)	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-10 дней. Расход - 4 л/100 м ²		
	4 мл/10 л воды (Л)	Смородина	Клещи	Опрыскивание в период вегетации. Расход - 1 л на куст	2(2)	
	3 мл/10 л воды (Л)		Пяденицы, листовертки		2(1)	
	4 мл/10 л воды (Л)		Паутинный и красный плодовой клещ, клещ Шлехтендаля, розанная, всеядная, сетчатая, ивовая кривоусая листовертки, бурополосая пяденица	Опрыскивание в период вегетации. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)		
	2 мл/10 л воды (Л)	Томаты, огурцы, перцы, баклажаны защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней. Расход - 10 л/100 м ²	2(2-3)	2(-)
	8-12 мл/10 л воды (Л)		Тли	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход - 10 л/100 м ²		
	20 мл/10 л воды (Л)		Табачный, западный цветочный трипсы	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней. Расход - 10 л/100 м ²		
	4 мл/10 л воды (Л)	Розы защищенного грунта	Паутинный клещ			
	8 мл/10 л воды (Л)		Зеленая розанная тля	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14-16 дней. Расход - 10 л/100 м ²		
	16 мл/10 л воды (Л)		Западный цветочный трипс	Опрыскивание в период цветения с интервалом 7 дней. Расход - 10 л/100 м ²		
Фитоверм-М, КЭ (2 г/л) ООО НБЦ «Фармбиомед» 3/3	1,2-1,6	Белокочанная капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 14 дней	2(1-2)	2(1)
	0,8-1,2	Смородина	Клещи	Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 20 дней		
	1		Розанная листовертка			

1	2	3	4	5	6	7
01-2515-0111-1 12.2013	1,5-2	Яблоня	Яблонная плодоярка	Опрыскивание в период вегетации против гусениц первого и второго поколения		
	0,75-1		Листовертки, пяденицы, горностаевая моль, яблонный цветоед, почковые долгоносики	Опрыскивание в период полного выдвижения бутонов	2(1)	
	0,6-0,9		Клещи	Опрыскивание в период вегетации	2(1-2)	
	1-1,5		Тли	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-10 дней при массовом заселении вредителем	2(1-3)	
	0,4	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации по мере появления вредителя с интервалом 20 дней	2(2-4)	
	1,2		Картофельная коровка			
	1,5-2	Хмель	Паутинный клещ, тли	Опрыскивание в период вегетации по мере появления вредителя	2(1-3)	
	0,2-0,4	Баклажаны	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-14 дней	2(2)	
	1-2	Огурцы, перцы, баклажаны защищенного грунта	Паутинный клещ		2(2-3)	
	4-8		Тли			
	5-10		Табачный, западный цветочный трипсы			
	1,6-2,4	Цитрусовые	Серебристый цитрусовый клещ	Опрыскивание в период вегетации по мере появления вредителя	2(2)	

Альфа-циперметрин

(Р) Пикет, КЭ (100 г/л) ООО «Лазорик-Дон» 3/2 1045-08-101-272-1-1-1-0 10.02.2010	0,1-0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	28(2)	-(4)
	0,1		Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица			
		Ячмень	Пьявица			
(Р) Фастак, КЭ (100 г/л) БАСФ Агро Б.В. 2/2 0957-07-101-004-1-1-2-0 20.03.2008	0,1-0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	15(2)	10(4)
	0,1				Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица	
		Ячмень	Пьявица			
	0,1-0,15	Горчица	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки		30(2)	
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук			
	0,24-0,36	Виноград	Листовертки, листовая филлоксеры			
	0,15-0,2	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в фазе бутонизации	-(1)	
	0,2-0,3	Яблоня	Яблонная плодоярка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации	50(2)	
	0,1	Свекла сахарная и кормовая	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха		45(2)	
		Табак	Тли		14(1)	
	0,15	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые		20(1)	
	(Р) Альфа-Ципи, КЭ (100 г/л) ООО «Агрорус и Ко», Агротрейд Лтд. 2/1 0561-07-101-170 (172)-1-1-1-0 19.02.2009	0,1-0,15	Пшеница		Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации
0,1				Блошки, тли, трипсы, пьявица, цикадки		
0,1-0,15		Ячмень	Пьявица	20(1)		
0,07-0,1		Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	
0,1-0,15		Лен-долгунец	Блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	
0,2		Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в период вегетации	-(1)	
0,2-0,3		Свекла сахарная	Долгоносики	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(1)	

1	2	3	4	5	6	7
	0,3	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	
(Р) Цезарь, КЭ (100 г/л) ООО АНПП «Агрохим XXI» 2/1 0636-07-101-162-1-1-1-0 19.03.2009	0,1-0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	15(2)	-(3)
	0,1	Ячмень	Блошки, тли, цикадки, трипсы, пяденица	Опрыскивание в период вегетации	20(2)	
	0,1-0,15	Горчица (кроме горчицы на масло)	Репсовый цветоед, крестоцветные блошки			
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	
	0,1	Зеленый горошек, горох	Гороховая тля			
	0,15-0,2	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в фазе бутонизации	-(1)	
	0,1-0,15	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	
(Р) Цунами, КЭ (100 г/л) ООО «Сибгрозхим» 3/1 0692-07-101-113-1-1-1-0 28.03.2009	0,1-0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	20(2)	10(4)
	0,1	Ячмень	Блошки, тли, цикадки, трипсы, пяденица			
	0,1-0,15	Горчица (кроме горчицы на масло)	Репсовый цветоед, крестоцветные блошки			
	0,1	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля		20(1)	
	0,15-0,2	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в фазе бутонизации	-(1)	
	0,1-0,15	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок	20(1)	
(Р) Альфас, КЭ (100 г/л) ООО «Северо-Кавказский Агрохим» 3/1 0776-07-101-115-1-1-1-0 09.05.2009	0,1-0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	20(2)	10(4)
	0,1	Ячмень	Блошки, тли, цикадки, трипсы, пяденица			
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук			
	0,15-0,2	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в фазе бутонизации	-(1)	
	0,1-0,15	Горчица (кроме горчицы на масло)	Репсовый цветоед, крестоцветные блошки		20(2)	
	0,1	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля		20(1)	
	0,1-0,15	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок	20(1)	
(Р) Альтерр, КЭ (100 г/л) ООО «АсТеро Групп» 3/1 0749-07-101-114-1-1-1-0 27.04.2009 (Р) Альфацин, КЭ (100 г/л) ООО «Юнайтед-химпром» 3/1 0779-07-101-243-1-1-1-0 16.05.2009	0,1-0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	20(2)	10(4)
	0,1	Ячмень	Блошки, тли, цикадки, трипсы, пяденица			
	0,1-0,15	Горчица (кроме горчицы на масло)	Репсовый цветоед, крестоцветные блошки			
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук			
	0,1	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля		20(1)	
	0,15-0,2	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в фазе бутонизации	-(1)	
	0,1-0,15	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок	20(1)	

1	2	3	4	5	6	7
(Р) Альфапанс, КЭ (100 г/л) ООО «Агрусхим» 3/1 0781-07-101-028-1-1-1-0 16.05.2009 (Р) АлтАльф, КЭ (100 г/л) ООО «Агровит» 3/1 0782-07-101-180-1-1-1-0 16.05.2009 (Р) Аккорд, КЭ (100 г/л) ООО «Кирово-Чепецкая химическая компания» 3/1 0789-07-101-223-1-1-1-0 16.05.2009						
(Р) Фагот, КЭ (100 г/л) ООО «АЛСИКО-АГРОПРОМ» 2/1 1100-08-101-036-1-1-1-0 30.03.2010	0,1-0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)
	0,1		Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица			
		Ячмень	Пьявица			
	0,1-0,15	Рапс яровой, горчица (кроме горчицы на масло)	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки			
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук			
	0,1	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодоярка, гороховая тля		20(1)	
		Свекла сахарная и кормовая	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха, луговой мотылек		20(2)	
	0,15-0,2	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	
0,1-0,15	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га			
(Р) Фаскорд, КЭ (100 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» 2/2 1088-08-101-019-0-1-2-0 20.03.2018	0,1-0,15	Пшеница	Внутрстеблевые мухи	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(2)	-(3)
	0,1		Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	
		Ячмень	Пьявица			
	0,1-0,15	Рапс, горчица (кроме масла)	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки			
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук			
	0,1	Горох овощной, горох	Гороховая зерновка, гороховая плодоярка, гороховая тля		20(1)	
		Свекла сахарная, кормовая	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха		45(2)	
	0,15-0,2	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га	-(1)	
	0,3	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га		
Алюминия фосфид						
(Р) Алфос, ТАБ (560 г/кг) ООО «АсТеРо Групп»	5 г/м³	Незагруженные зернохранилища	Насекомые-вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха выше 15 ⁰ С. Экспозиция - 5 суток. Произведение концентрации на время экспозиции ПКЭ - 25 г·ч/м³. Допуск	-(-)	-(-)

1	2	3	4	5	6	7
1/- 0829-07-101-114- 1-1-0-0 04.07.2009				людей и загрузка складов после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК		
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов, партии массой не более 200 т насыпью до 2,5 м и затаренные в мешки под пленкой		Фумигация при температуре зерна выше 15 ⁰ С. Экспозиция - 5 суток. ПКЭ 25 г·ч/м ³ . Дегазация - не менее 10 суток. Реализация при остатке фосфина - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК - не ранее 11 дня после начала дегазации		
	2,4 г/м ³	Зерно злаковых культур, тапиоки и шрота в трюмах отечественных судов балкерного типа и танкерах в иностранных портах погрузки в части их досмотра и выгрузки в отечественных портах		Фумигация при температуре зерна выше 15 ⁰ С. Экспозиция при использовании: технологии «фитоэксплофумигация» - 16 суток; метода рециркуляции - не менее 10 суток. Дегазация в рейсе и на рейде. Досмотр зерна и разгрузка при концентрации фосфина над поверхностью зерна на высоте 0,5-1 м - не выше 0,1 мг/м ³ и в межзерновом пространстве на глубине 0,3 м от поверхности зерна - не выше 50 мг/м ³ . Реализация при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК		
Фоском, ТАБ, Г (560 г/кг) ООО НПО «РосАгроХим» 1/- 01-2304-0789 (0760)-0 12.2014 Фосфин, ТАБ, Г (560 г/кг) ООО НПО «РосАгроХим» 1/- 01-00398-0760-0 12.2014	5 г/м ³	Незагруженные зернохранилища	Насекомые-вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха выше 15 ⁰ С. Экспозиция - 5 суток. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК	-(-)	-(-)
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов, небольшие партии массой не более 200 т насыпью до 2,5 м и затаренные в мешки под пленкой		Фумигация при температуре зерна выше 15 ⁰ С. Экспозиция - 5 суток. Дегазация - не менее 10 суток. Реализация при остатке фосфина - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК		
	6 г/м ³	Мука, крупа в складах или под пленкой		Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 ⁰ С. Экспозиция - 5 суток. Дегазация - не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК		
		Зерноперерабатывающие и пищевые предприятия		Фумигация при температуре воздуха выше 15 ⁰ С. Экспозиция - 2 суток. Допуск людей и загрузка складов после проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК		
	5 г/м ³	Сухие овощи в складах или под пленкой		Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 ⁰ С. Экспозиция - 5 суток. Дегазация - не менее 5 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК		

1	2	3	4	5	6	7
	2,4 г/м ³	Зерно злаковых культур, сои-бобов, тапиоки и шрота в трюмах отечественных судов балкерного типа и танкерах в иностранных портах погрузки и иностранных судов в части их досмотра и выгрузки в отечественных портах		Фумигация при температуре зерна выше 15 ⁰ С. Экспозиция при использовании: технологии «фитоэксплофумигация» - 16 суток; метода рециркуляции - не менее 10 суток. Дегазация в рейсе и на рейде. Досмотр зерна и разгрузка при концентрации фосфина над поверхностью зерна на высоте 0,5-1 м - не выше 0,1 мг/м ³ и в межзерновом пространстве на глубине 0,3 м от поверхности зерна - не выше 50 мг/м ³ . Реализация при остатке фосфина - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК		
Фоском, ТАБ, Г (560 г/кг) ЗАО «Русинвест» 1/- 01-2304-0789(0760)-012.2014 Катфос, ТАБ, Г (560 г/кг) ЗАО «Русинвест» 1/- 01-00689-0789-012.2014	5 г/м ³	Незагруженные зернохранилища	Насекомые-вредители запасов и хлебные клещи	Фумигация при температуре воздуха выше 15 ⁰ С. Экспозиция - 5 суток. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК	-(-)	-(-)
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов, небольшие партии массой не более 200 т насыпью до 2,5 м и затаренные в мешки под пленкой		Фумигация при температуре зерна выше 15 ⁰ С. Экспозиция - 5 суток. Дегазация - не менее 10 суток. Реализация при остатке фосфина - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК		
	6 г/м ³	Мука, крупа в складах или под пленкой		Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 ⁰ С. Экспозиция - 5 суток. Дегазация - не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК		
		Зерноперерабатывающие и пищевые предприятия		Фумигация при температуре воздуха выше 15 ⁰ С. Экспозиция - 2 суток. Допуск людей и загрузка складов после проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК		
	5 г/м ³	Сухие овощи в складах или под пленкой		Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 ⁰ С. Экспозиция - 5 суток. Дегазация - не менее 5 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК		
	2,4 г/м ³	Зерно злаковых культур, сои-бобов, тапиоки и шрота в трюмах отечественных судов балкерного типа и танкерах в иностранных портах погрузки и иностранных судов в части их досмотра и вы-		Фумигация при температуре зерна выше 15 ⁰ С. Экспозиция при использовании: технологии «фито-экспло фумигация» - 16 суток; метода рециркуляции - не менее 10 суток. Дегазация в рейсе и на рейде. Досмотр зерна и разгрузка при концентрации фосфина над поверхностью зерна на высоте 0,5-1 м - не выше 0,1 мг/м ³ и в межзерновом пространстве на глубине 0,3 м от поверхности зерна - не выше 50 мг/м ³ . Реализация при остатке фосфина - не		

1	2	3	4	5	6	7
		грузки в отечественных портах		выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК		
Шаралфос, ТАБ, Г (560 г/кг) Компания «Шарда Интернэшнл» 1/- 0334-06-101-100-0-0-0-0 12.2015	5 г/м ³	Незагруженные зернохранилища	Насекомые-вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха выше 15°C. Экспозиция - 5 суток. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК	(-)	(-)
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой	Хлебные клещи	Фумигация при температуре зерна выше 15°C. Экспозиция - 10 суток, ПКЭ - 450 г·ч/м ³ . Дегазация - не менее 10 суток. Реализация при остатке фосфина - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК		
	6 г/м ³	Зерноперерабатывающие и пищевые предприятия	Насекомые - вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха выше 15°C. Экспозиция - 2 суток. Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК		
(Р) Фумифаст, ТАБ (560 г/кг) ООО «Агро Эксперт Групп» 1/- 0710-07-101-023-0-1-0-0 09.04.2017	5 г/м ³	Незагруженные зернохранилища	Насекомые - вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха выше 15°C. Экспозиция - 5 суток. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК	(-)	(-)
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренные в мешки под пленкой		Фумигация при температуре зерна выше 15°C. Экспозиция - 5 суток. ПКЭ 25 г·ч/м ³ . Дегазация - не менее 10 суток. Реализация при остатке фосфина - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК		
	2,4 г/м ³	Зерно злаковых культур, тапиоки и шрота в трюмах судов балкерного типа и танкерах		Фумигация при температуре зерна выше 15°C. Экспозиция при использовании: технологии «фитоэксплофумигация» - 16 суток; метода рециркуляции - не менее 10 суток. Дегазация в рейсе и на рейде. Досмотр зерна и разгрузка при концентрации фосфина над поверхностью зерна на высоте 0,5-1 м - не выше 0,1 мг/м ³ и в межзерновом пространстве на глубине 0,3 м от поверхности зерна - не выше 50 мг/м ³ . Реализация при остатке фосфина - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК		
(Р) Лакфосал, ТАБ (570 г/кг) ЗАО «Щелково Агрохим»	5 г/м ³	Незагруженные зернохранилища	Насекомые-вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха выше 15°C. Экспозиция - 5 суток. Допуск людей и загрузка хранилищ после полного проветривания и при	(-)	(-)

1	2	3	4	5	6	7
1/- 0726-07-101-019- 0-1-0-0 24.04.2017				содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК		
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой	Насекомые и клещи-вредители запасов	Фумигация при температуре зерна выше 15°C. Экспозиция - 5 суток для насекомых и 9 суток для клещей. Производство концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 25 г·ч/м³ для насекомых и 450 г·ч/м³ для клещей. Дегазация - не менее 10 суток. Реализация при остатке фосфина - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК		

Ацетамиприд

(Р) Моспилан, РП (200 г/кг) Ниппон Сода Ко., Лтд. 3/3 0308-06-101- 094-0-1-3-1 12.2015	0,05-0,075	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	28(1)	-(-)
	0,15-0,175		Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов		
	0,15-0,2	Томаты и огурцы защищенного грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации	1(1)	1(-)
	0,025-0,04	Картофель	Колорадский жук		14(1)	3(3)
	0,1-0,125		Картофельная коровка			
	0,06-0,08	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок		-(-)
	0,5-0,8 г/10 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 5 л/100 м²	14(1)	3(3)
(Р) Моспилан, РП (20 г/кг) Ниппон Сода Ко., Лтд. 3/3 0307-06-101- 094-0-1-3-1 12.2015	0,5-0,75	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	28(1)	-(-)
	1,5-1,75		Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов		
	1,5-2	Томаты и огурцы защищенного грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации	1(1)	1(-)
	0,25-0,4	Картофель	Колорадский жук		14(1)	3(3)
	1-1,25		Картофельная коровка	Опрыскивание в период вегетации при достижении ЭПВ		
	0,6-0,8	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок		-(-)
	5-8 г/10 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 5 л/100 м²	14(1)	3(3)
	20-24 г/10 л воды (Л)		Картофельная коровка			

Бенсултан

Банкол, СП (500 г/кг) Сумитомо Кемикал Такеда Агро Ко., Лтд. 3/3 0309-06-101- 095-0-0-3-1 12.2015	0,6-0,8	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов	-(1)	7(3)
	0,2-0,3	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	20(2)	
	1	Рапс (семенные посевы)	Рапсовый цветоед		-(2)	
	0,3-0,5	Томаты, баклажаны	Колорадский жук		40(2)	
	4-6 г/10 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 5 л/100 м²	20(2)	7(3)
		Томаты, баклажаны			40(2)	
	7-10 г/100 м² (Л)	Овощные, цветочные культуры, картофель, земляника	Медведка	Внесение в почву на глубину 3-10 см до высадки рассады или в период вегетации. Расход приманки - 1 кг/100 м²	-(2)	

Бета-циперметрин

(Р) Кинмикс, КЭ (50 г/л) Агро-Кеми Кфт. 3/1 01-0202-0015-1 12.2013	0,4-0,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов	-(1)	-(-)
	0,2-0,3	Пшеница озимая и яровая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	20(2)	-(4)
	0,2	Ячмень	Блошки, тли, цикадки, трипсы, пядица		25(1)	

1	2	3	4	5	6	7
* - до 09.02.2006	0,25-0,5	Свекла сахарная	Подгрызающие совки, свекловичные блошки, тли, долгоносики, свекловичная минирующая муха		20(2)	10(4)
	0,15-0,2	Картофель	Колорадский жук			
	0,2-0,3	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль			
		Рапс	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки			
	0,3-0,4	Люцерна	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в фазе бутонизации	40(1)	
	0,48-0,72	*Виноград	Листовертки, листовая филлоксера	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	
	0,24-0,4	Яблоня	Тли, медяница, жуки	Опрыскивание до цветения. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	-(1)	
	0,4-0,6		Яблонная плодовая жорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации	20(2)	
	0,32-0,48	*Слива, черешня, вишня	Комплекс вредных насекомых	Опрыскивание до цветения и после цветения. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)		
	0,24-0,48	Крыжовник	Пилильщики, тли	Опрыскивание в период вегетации		
		Смородина	Комплекс вредных насекомых			
	0,5-0,6	*Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	21(1)	
	0,15-0,2	Шиповник	Долгоносики, листовертки	Опрыскивание в фазе бутонизации	20(1)	
	0,15-0,3	Ревень тангутский	Блошки	Опрыскивание в фазе всходов, отрастания растений 2-го года вегетации (уборка на 3 год)	-(1)	-(4)
		Расторопша пятнистая		Опрыскивание в фазе 4-5 настоящих листьев		
	0,15-0,2	Пустырник пятилопастный (семенные посевы)	Цикадки	Опрыскивание в период вегетации		
2,5 мл/10 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 10 л/100 м²	20(1)	10(4)	
	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль				
	*Виноград	Листовертки, листовая филлоксера	Опрыскивание в период вегетации. Расход - от 2 до 5 л на куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)	30(2)		
	Смородина	Комплекс вредных насекомых	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 1-1,5 л на 1 куст	20(2)		
	Крыжовник					
	Вишня, черешня		Опрыскивание в период вегетации. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)			
	Слива	Шелкопряды, моли, листоеды, пяденицы, тли				
	Яблоня	Комплекс вредных насекомых				

Бифентрин

(Р) Клипер, КЭ (100 г/л) ЗАО «ФМРус» 2/1 0868-07-101-101- 1-1-1-0 09.08.2009	1,2-2,4	Томаты защищен- ного грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации 0,06%-м рабочим раствором	3(1)	3(-)
	0,6-1,2		Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации 0,03%-м рабочим раствором		
	0,4-0,8		Тли	Опрыскивание в период вегетации 0,02%-м рабочим раствором		
	1,2-2,4	Огурцы защищен- ного грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации 0,06%-м рабочим раствором	5(1)	
	0,6-1,2		Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации 0,03%-м рабочим раствором		

1	2	3	4	5	6	7
	0,4-0,8		Тли	Опрыскивание в период вегетации 0,02%-м рабочим раствором		
(Р) Семафор, ТПС (200 г/л) ФМСи Кемикал 2/- 0640-07-101-183-1-1-0-0 19.03.2009	2	Подсолнечник	Проволочники	Обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
	2-2,5	Кукуруза				
(Р) Талстар, КЭ (100 г/л) ФМСи Кемикал 2/1 0739-07-101-183-1-1-1-0 24.04.2009	1,2-2,4	Томаты, огурцы защищенного грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации 0,06%-м рабочим раствором	3(1)	3(-)
	0,6-1,2		Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации 0,03%-м рабочим раствором		
	0,4-0,8		Тли	Опрыскивание в период вегетации 0,02%-м рабочим раствором		

Вазелиновое масло

(Р) Препарат 30, ММЭ (760 г/кг) ФГУП «ВНИИХСЗР», ООО «НПФ «Совер» 3/1 0590-07-101-051 (194)-1-1-1-0 01.03.2009	40-100	Яблоня, груша, слива, вишня	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, медяницы, молей, червецов	Опрыскивание до распускания почек весной при температуре не ниже +4°C	-(1)	-(-)
		Крыжовник, малина, смородина				
	20-50	Цитрусовые	Щитовки, ложнощитовки, клещи, белокрылка, червецы	Опрыскивание в период относительного покоя культуры при температуре не ниже +4°C в концентрации 3-4%		
	40-100	Декоративные культуры	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, медяницы, молей, червецов	Опрыскивание до распускания почек весной при температуре не ниже +4°C		
	12-37	Виноград	Зимующие стадии ложнощитовок, клещей, тлей, червецов	Опрыскивание до распускания почек весной		

Вирус гранулеза сибирского шелкопряда

(Р) Вирин-ГСШ, Ж (титр 50 млрд гранул/мл) Институт систематики и экологии животных СО РАН 4/4 01-0647-0112-1 12.2008	0,1 (А)	Лиственница, кедр, сосна	Сибирский шелкопряд (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации	-(1)	-(1)
--	---------	--------------------------	---	---------------------------------	------	------

Вирус ядерного полиэдроза рыжего соснового пилильщика

Вирин-Диприон, Ж (титр 1 млрд полиэдров/мл) Институт систематики и экологии животных СО РАН, ВНИИ бакпрепарат 4/4 01-0719-0091(0112)-1 12.2008	0,01-0,004 (А)	Сосна	Рыжий сосновый пилильщик (личинки 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации	-(1)	-(1)
--	----------------	-------	---	---------------------------------	------	------

Вирус ядерного полиэдроза шелкопряда монашенки

(Р) Вирин-ПШМ, Ж (титр 1 млрд полиэдров/мл) Институт систематики и экологии животных СО РАН 4/4 01-0648-0112-1 12.2008	0,5 (А)	Сосна	Шелкопряд монашенка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации	-(1)	-(1)
--	---------	-------	---	---------------------------------	------	------

1	2	3	4	5	6	7
Гамма-цигалотрин						
(Р) Вантекс 60, МКС (60 г/л) Дау АгроСаенсес ВмбХ 3/1 1005-08-101-166-1-1-1-0 21.01.2010	0,04-0,07	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(1)	-(3)
	0,06-0,07	Пшеница	Клоп вредная черепашка, тли, пядицы			
		Ячмень	Пьявица			
	0,04-0,06	Рапс	Рапсовый цветоед		20(2)	
	0,2-0,35	Яблоня	Яблонная плодовая жук, листовертки			
	0,06-0,08	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок младших возрастов	30(1)	
	0,12-0,16			Опрыскивание в период развития личинок старших возрастов		
Дельтаметрин						
(Р) Децис Экстра, КЭ (125 г/л) Байер КронСайенс АГ 2/1 1063-08-101-010-1-1-1-0 21.02.2010	0,05	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пядица, тли, трипсы, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации	20(2)	7(3)
	0,04		Злаковые мухи		20(1)	
	0,06		Зерновая совка			
	0,1-0,14	Кукуруза	Хлопковая совка		20(2)	
	0,1		Кукурузный мотылек			
	0,05	Ячмень	Пьявица		20(1)	
	0,04		Хлебные блошки, злаковые мухи			
	0,02-0,03	Картофель	Колорадский жук		20(2)	
	0,04		Картофельная моль			
	0,05-0,1	Свекла сахарная	Луговой мотылек			
	0,04	Горох	Гороховая тля		30(2)	
	0,05-0,1	Томат открытого грунта	Подгрызающие совки		30(1)	
	0,03		Колорадский жук			
	0,06	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль, тли, блошки		20(2)	
			Лен-долгунец		-(1)	
	0,1-0,2	Яблоня	Плодожорки листовертки, тли		30(2)	
	0,1	Груша	Грушевая медяница			
	0,06	Конопля техническая	Блошки			
	0,06-0,1		Листовертки, кукурузный мотылек			
(Р) Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) Байер КронСайенс АГ 3/1 0671-07-101-010-1-1-1-1 28.03.2009	0,03-0,04	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пядица, тли, трипсы, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации	20(2)	7(3)
	0,02		Злаковые мухи		20(1)	
	0,03		Зерновая совка			
	0,05-0,07	Кукуруза на зерно	Хлопковая совка		20(2)	
	0,05		Кукурузный мотылек			
	0,025	Ячмень	Пьявица		20(1)	
	0,02		Хлебные блошки, злаковые мухи			
	0,025	Подсолнечник (на масло)	Луговой мотылек		20(2)	
	0,025-0,03	Картофель	Колорадский жук			
	0,02		Картофельная моль			
	0,025-0,05	Свекла сахарная	Луговой мотылек			
	0,02	Горох	Гороховая тля		30(2)	
	0,03	Рапс	Рапсовый цветоед, клопы, белянки, блошки, тли		20(2)	
	0,02-0,04	Томаты открытого грунта	Подгрызающие совки		30(1)	
	0,025-0,03		Колорадский жук			
	0,03	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль, тли, блошки		20(2)	
			Морковь		20(1)	
		Лен-долгунец	Блошки		-(1)	

1	2	3	4	5	6	7
	0,05-0,1	Яблоня	Плодожорки, листовертки, тли		30(2)	
	0,06	Груша	Грушевая медяница			
	0,04-0,06	Виноград	Листовертки			
	0,04-0,05	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок	20(1)	
	0,3 г/100 м ² (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 5 л/100 м ²	20(2)	7(3)
		Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, блошки			
	0,4 г/100 м ² (Л)	Томаты открытого грунта	Колорадский жук, подгрызающие совки			
0,5 г/10 л воды (Л)	Яблоня	Плодожорки, листовертки, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - от 2 до 5 л/дерево в зависимости от сорта и возраста	30(2)		
(Р) Атом, КЭ (25 г/л) ООО «Агрорус XXI», Панама Агрокемикалс Инк. 2/1 0541-07-101-176 (177)-1-1-1-0 06.02.2009	0,25	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица, тли, трипсы, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации	20(2)	-(3)
	0,2		Злаковые мухи		20(1)	
	0,3		Зерновая совка			
	0,5-0,7	Кукуруза (зерно)	Хлопковая совка		20(2)	
	0,5		Кукурузный мотылек			
	0,25	Ячмень	Пьявица		20(1)	
	0,2		Хлебные блошки, злаковые мухи			
	0,25	Подсолнечник	Луговой мотылек		20(2)	
	0,1-0,15	Картофель	Колорадский жук			
	0,2		Картофельная моль			
	0,25-0,5	Свекла сахарная	Луговой мотылек			
	0,2	Горох (зерновой)	Гороховая тля		30(2)	
	0,25-0,5	Томаты	Подгрызающие совки		30(1)	
	0,15		Колорадский жук			
	0,3	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль, тли, блошки		20(2)	
			Лен-долгунец		Блошки	
	0,4-0,5	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок	20(1)	
	0,3-0,5	Крестоцветные культуры	Блошки	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	
	0,5-1	Яблоня	Плодожорки, листовертки, тли			
	0,6	Груша	Грушевая медяница			
	0,4-0,6	Виноград	Листовертки			
	0,6-1	Хмель	Тли		25(2)	
	1		Скосарь люцерновый	Опрыскивание всходов	-(2)	
	0,2	Люпин (семенные посевы)	Минирующая муха, тли	Опрыскивание в начале цветения	-(1)	
	3-4	Чай	Чайная тля	Опрыскивание нелистооборных плантаций	-(2)	
	(Р) ФАС, ТАБ (10 г/кг) ЗАО НПО «Гигиена-Био» 3/1 0544-07-101-048-1-1-1-1 06.02.2009	1 таблетка/100 м ² (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход воды - до 5 л/100м ²	
2 таблетки/100 м ² (Л)		Капуста	Листогрызущие гусеницы			
Диазинон						
(Р) Диазинон Агро, КЭ	1,5-1,8	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов	-(1)	-(3)

1	2	3	4	5	6	7	
(600 г/л) ООО НПЦ «Фокс и Ко» 3/1 0991-08-101-278- 1-1-1-0 09.01.2010							
(Р) Мухоед, Г (40 г/кг) ЗАО Фирма «Август» 3/- 0921-07-101-003- 1-1-0-1 19.11.2009	40 г/10 м ² (Л)	Капуста (кроме раннеспелых сор- тов)	Капустные мухи	Внесение на поверхность почвы при высадке рассады	-(1)	7(-)	
	50 г/10 м ² (Л)	Лук (кроме лука на перо)	Луковая муха	Внесение на поверхность почвы при высадке луковиц			
	2-3 г/м ² (Л)	Горшечные цве- точные растения	Почвенные мушки, грибные комарики, бороздчатый дол- гоносик	Внесение на поверхность почвы вокруг растений	-(2)		
(Р) Баргузин-600, КЭ (600 г/л) ООО «Агрусхим» 3/1 0830-07-101-028- 1-1-1-0 04.07.2009	1,5-1,8	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов	-(1)	10(4)	
	1,8-2	Свекла сахарная	Обыкновенный свеклович- ный долгоносик, щитоноски, мертвоеды, крошка	Опрыскивание в период вегетации	20(2)		
	1,5-2		Восточный и восточный полосатый долгоносики				
	0,8		Блошки, листовая тля				
	1	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль		30(1)		
	2	Клевер (семенные посевы)	Долгоносики, тли, клопы, совки, огневки, луговой мо- тылек, толстоножки		-(2)		
	1,7	Конопля (техниче- ские нужды)	Конопляная блошка	Опрыскивание всходов	-(1)		
	2	Люцерна (семен- ные посевы)	Долгоносики, клопы, совки, огневки, луговой мотылек, толстоножки, тли	Опрыскивание в период вегетации	-(2)		
1,6	Тимофеевка (се- менные посевы)	Колосовые мухи	Опрыскивание в фазе скрытого форми- рования султанов	-(1)			
(Р) Диазол, КЭ (600 г/л) Мактешим-Аган Индастриз Лтд. 2/1 01-0344-0135-0 12.2011	1,5-1,8	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов	-(1)	-(4)	
	1,5	Ячмень	Злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации	30(1)		
	0,5		Тли				
	1,8-2	Свекла сахарная	Обыкновенный свеклович- ный долгоносик, щитоноски, мертвоеды, крошка	Опрыскивание в период вегетации	20(2)	10(4)	
	1,5-2		Восточный и восточный полосатый долгоносики				
	0,8		Блошки, листовая тля				
	1-1,5	Табак	Подгрызающие совки		13(4)		
	2-2,5	Клевер (семенные посевы)	Долгоносики, тли, клопы, совки, огневки, луговой мо- тылек, толстоножки		-(3)		
	2	Хмель	Тли		13(4)		
	2-2,5		Скосарь люцерновый	Опрыскивание всходов			
	1	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	30(1)	10(4)	
	1,7	Конопля	Конопляная блошка	Опрыскивание всходов	-(1)	-(4)	
	2-3	Люцерна (семен- ные посевы)	Долгоносики, клопы, совки, огневки, луговой мотылек, толстоножки, тли	Опрыскивание в период вегетации	-(2)		
	1,6	Тимофеевка (се- менные посевы)	Колосовые мухи	Опрыскивание в фазе скрытого форми- рования султанов	-(1)		
	1,5	Шалфей мускатный	Шалфейный долгоносик, тли	Опрыскивание в период вегетации	20(2)		
		Роза эфиромас- личная	Тли, клещи, листовертки, цикадки				
	0,83	Дуб	Зеленая дубовая листовертка, златогузка (гусеницы млад- ших возрастов)	Опрыскивание. Разрешается выпас лактующего скота через 15 дней, откормочного и молодняка - 10, сбор	-(1)	-(-)	

1	2	3	4	5	6	7
				грибов и ягод - 12, отдых - 5 , сенокосение - 5 дней		
(Р) Диазинон, КЭ (600 г/л) Ниппон Каяку Ко., Лтд. 3/1 0306-06-101-093-0-1-1-0 12.2015	1,5-1,8	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов	-(1)	10(4)
	1,5	Ячмень	Внутривебные мухи	Опрыскивание в период вегетации	30(1)	
	0,5		Тли		20(2)	
	1,5-2	Свекла сахарная	Долгоносики, щитососы, мертвоеды, крошка			
	0,8		Блошки, листовая тля			
	1-1,5	Табак	Подгрызающие совки			
	2-2,5	Клевер (семенные посевы)	Долгоносики, тли, клопы, совки, огневки, луговой мотылек, толстоножки			
	2	Хмель	Тли	Опрыскивание всходов	-(1)	
	2-2,5		Скосарь люцерновый			
	1,7	Конопля	Конопляная блошка	Опрыскивание всходов	30(1)	
1	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	30(1)		
2-3	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, совки, огневки, луговой мотылек, толстоножки, тли	Опрыскивание в период вегетации	-(2)		
1,6	Тимофеевка (семенные посевы)	Колосовые мухи	Опрыскивание в фазе скрытого формирования султанов	-(1)		
(Р) Гром, Г (30 г/кг) ООО «Фирма «Зеленая аптека садовода» 3/- 0115-06-101-030-0-1-4-1 12.2015	30 г/10 м ² (Л)	Овощные, цветочные культуры, земляника, картофель	Медведка	Внесение в почву на глубину 3-5 см в период вегетации	20(1)	10(4)
	20-30 г/10 м ² (Л)	Овощные, цветочные культуры, земляника, картофель, защищенный грунт, плодовые деревья, кустарники около строений	Муравьи	Внесение в муравейник на глубину 2-3 см	20(1)	-(-)
(Р) Гром-2, Г (30 г/кг) ООО «Фирма «Зеленая аптека садовода» 3/- 0116-06-101-030-0-1-4-1 12.2015	20-30 г/10 м ² (Л)	Овощные, цветочные культуры, земляника, картофель, защищенный грунт, плодовые деревья, кустарники, около строений	Муравьи	Внесение в муравейник на глубину 2-3 см	20(1)	-(-)
	2-3 г/м ² (Л)	Горшечные цветочные растения	Почвенные мушки, грибные комарики	Внесение на поверхность почвы в горшке вокруг растений с последующей заделкой в почву	20(1)	10(4)
		Рассада овощных и цветочных культур		Внесение на поверхность почвы вокруг растений с последующей заделкой в почву		
(Р) Медветокс, Г (50 г/кг) ЗАО «ТПК Техноэкспорт» 3/- 0485-06-101-035-1-1-0-1 06.12.2008	2-3 г/м ³ (Л)	Цветочные культуры, картофель	Медведка	Внесение в почву на глубину 3-5 см в период вегетации	20(2)	10(-)
	3 г/м ³ (Л)		Муравьи	Внесение в места скопления муравьев в период вегетации	20(1)	20(-)
		Лук	Луковая муха	Внесение на поверхность почвы при посадке луковиц с одновременным рыхлением		
		Капуста	Капустные мухи	Внесение на поверхность почвы при посадке рассады с одновременным рыхлением		
		Картофель	Проволочники	Внесение в почву при посадке		
		Рассада цветочных культур	Бороздчатый долгоносик	Внесение на поверхность почвы вокруг растений		
		Газоны	Муравьи	Внесение в муравейник на глубину 2-3 см		
(Р) Диазинон Экспресс, КЭ	1,5-1,8	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов	-(1)	10(4)
	1,5	Ячмень	Злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации		

1	2	3	4	5	6	7
(600 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» 3/1 0620-07-101-019- 1-1-1-0 12.03.2009	0,5		Тли			
	1	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль		30(1)	
	2	Клевер (семенные посевы) Люцерна (семен- ные посевы)	Долгоносики, тли, клопы, совки, огневки, луговой мотылек, толстоножки		-(2)	
	1,6	Тимофеевка (се- менные посевы)	Колосовые мухи	Опрыскивание в фазе скрытого формирования султанов	-(1)	
(Р) Муравьи, Г (50 г/кг) ЗАО «ТПК Техноэкспорт» 3/- 0684-07-101-035- 1-1-0-1 28.03.2009	30 г/10 м ² (Л)	Цветочные куль- туры, картофель, плодовые деревья, кустарники	Муравьи	Внесение в места скопления муравьев в период вегетации	20(1)	20(-)
		Лук (кроме лука на перо), капуста		Внесение на грядки сразу после посева или высадки рассады в грунт		
		Газоны		Внесение в муравейник на глубину 2-3 см		10(-)
(Р) Диазин Евро, КЭ (600 г/л) ООО НПО «РосАгроХим» 3/1 0785-07-101-161- 1-1-1-0 16.05.2009	1,5-1,8	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов	-(1)	10(3)
	1,5	Ячмень	Злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации		
	0,5		Тли			
	1,8-2	Свекла сахарная	Обыкновенный свеклович- ный долгоносик, щитонки, мертвоеды, крошка		20(2)	
	1,5-2		Восточный, восточный полосатый долгоносики			
	0,8		Блошки, листовая тля			
	2-2,5	Клевер (семенные посевы)	Долгоносики, тли, клопы, совки, огневки, луговой мотылек, толстоножки			
	1	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль		30(1)	
	1,7	Конопля	Конопляная блошка	Опрыскивание всходов	-(1)	
	2-3	Люцерна (семен- ные посевы)	Долгоносики, клопы, совки, огневки, луговой мотылек, толстоножки, тли	Опрыскивание в период вегетации	-(2)	
	1,6	Тимофеевка (се- менные посевы)	Колосовые мухи	Опрыскивание в фазе скрытого формирования султанов	-(1)	
(Р) Баргузин, Г (100 г/кг) ООО «Агрусхим» 3/- 0788-07-101-028- 1-1-0-1 16.05.2009	150 г/100 м ² (Л)	Картофель	Проволочники	Внесение в почву при посадке	20(1)	10(-)
	100 г/100 м ² (Л)	Капуста	Капустные мухи	Внесение на поверхность почвы при высадке рассады с последующим рыхлением	-(1)	20(-)
	1 г/м ² (Л)	Овощные культу- ры, кустарники	Муравьи	Внесение в муравейник на глубину 2-3 см		10(-)
(Р) Диазинон-600, КЭ (600 г/л) ООО «АЛСИКО- АГРОПРОМ» 2/3 1099-08-101-036- 1-1-3-0 30.03.2010	1,5-1,8	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов. Расход рабо- чей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	10(4)
	1,5	Ячмень	Внутристеблевые мухи	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	
	0,5		Тли			
	1,8-2	Свекла сахарная	Обыкновенный свеклович- ный долгоносик, щитонки, мертвоеды, крошка		20(2)	
	1,5-2		Восточный, восточный поло- сатый долгоносики			
	1		Блошки, листовая тля			
	2-2,5	Клевер (семенные посевы)	Долгоносики, тли, клопы, совки, огневки, луговой мо- тылек, толстоножки			
	1	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль		30(1)	
	1,7	Конопля (техниче- ского назначения)	Конопляная блошка	Опрыскивание всходов. Расход рабо- чей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	
	2-3	Люцерна (семен- ные посевы)	Долгоносики, клопы, совки, огневки, луговой мотылек,	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	

1	2	3	4	5	6	7
			толстоножки, тли			
	1,6	Тимофеевка (семенные посевы)	Колосовые мухи	Опрыскивание в фазе скрытого формирования султанов. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	

Диметоат

Би-58 Новый, КЭ (400 г/л) БАСФ АГ 3/1 0958-07-101-005-1-0-1-0 20.04.2008	1-1,2	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	10(4)
	1	Рожь, ячмень	Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы			
		Овес	Злаковые мухи, тли			
	0,7-0,9	Просо	Комарики, тли			
	0,5-0,9	Зернобобовые	Бобовая огневка, гороховая плодоярка, тли			
	0,8-1,2	Яблоня, груша	Щитовки, ложнощитовки, клещи, листоевтки, тли, медяница, моли, плодоярки, листогрызущие гусеницы, жуки	Опрыскивание до и после цветения	40(2)	
	1,5	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание до цветения	40(1)	
	1,2-2	Слива	Клещи, пилильщики, тли	Опрыскивание после цветения		
	1,2-2,8	Виноград	Клещи, червецы, листоевтки	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	
	2,8	Цитрусовые	Белокрылка, червецы, клещи, ложнощитовки, щитовки		40(2)	
	0,5-0,9	Свекла сахарная и кормовая	Клопы, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки		30(2)	
	0,5-0,7	Свекла столовая	Клещи, тли, трипсы, клопы			
	0,5-0,9	Овощные (семенные посевы)	Клещи, тли, трипсы, клопы			
	2	Картофель (семенные посевы)	Тли		20(2)	
	1,5-2	Картофель (семенные посевы)	Картофельная моль			
	0,5-0,9	Люцерна (семенные посевы)	Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи		30(2)	
		Лен-долгунец	Плодоярка, трипсы, совка-гамма			
	1,2-2	Конопля	Листоевтки, тли			
	1,4	Кенаф	Клопы, тли		30(1)	
	2-3	Шелковица	Клещи, червец Комстока	Опрыскивание до и после окончания выкармливания шелкопряда. Запрещается употреблять ягоды в пищу	30(2)	
	1,2-1,5	Смородина (питомники, маточники)	Листоевтки, галлицы, тли	Опрыскивание в период вегетации		
	0,6-1,1	Малина (маточники)	Клещи, тли, цикадки, галлицы			
	0,7	Люпин (семенные посевы)	Стеблевая минирующая муха, тли			
	1,5-2	Хмель	Совки, тли, луговой мотылек, пилильщики, клещи		30(3)	
	0,8-0,9	Табак	Трипсы, тли		30(2)	
(Р) Террадим, КЭ (400 г/л) ООО «АсТеРо Групп», ООО «Сибгрозхим» 3/1 0919-07-101-113(114)-1-1-1-0 15.06.2008	1-1,5	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	10(4)
			Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов		
	1-1,2	Рожь, ячмень	Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации		
		Овес	Злаковые мухи, тли			
	0,7-1	Просо	Комарики, тли			
	0,5-1	Зернобобовые	Бобовая огневка, гороховая плодоярка, тли			
		Свекла сахарная и кормовая	Клопы, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки			
	0,5-0,8	Свекла столовая	Клещи, тли, трипсы, клопы			

1	2	3	4	5	6	7			
	2-2,25	Картофель (се- менные посевы)	Тли	Опрыскивание до и после окончания выкормки шелковичного червя. За- прещается употреблять ягоды в пищу Опрыскивание в период вегетации	20(2)				
	1,5-2		Картофельная моль						
	0,5-1		Люцерна (семен- ные посевы)		Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи		30(2)		
		Лен-долгунец	Плодожорки, трипсы, совка- гамма		3(2)				
	1,2-2	Конопля	Листовертки, тли				30(2)		
	1,5	Кенаф	Клопы, тли				30(1)		
	2	Шелковица	Клещи, червец Комстока				30(2)		
	1,2-1,6	Смородина (питомники, маточники)	Листовертки, галлицы, тли						
	0,6-1,2	Малина (маточники)	Клещи, тли, цикадки, галли- цы						
	0,8	Люпин (семенные посевы)	Стеблевая минирующая муха, тли				30(1)		
	0,8-0,9	Махорка	Трипсы, тли				30(2)		
	1,5-3	Хмель	Совки, тли, луговой мотылек, пилильщики, клещи				30(3)	14(4)	
	0,8-0,9	Табак, махорка	Трипсы, тли				30(2)		
(Р) Дитокс, КЭ (400 г/л) ООО «Агрусхим» 3/1 0815-07-101-028- 1-1-1-0 14.06.2009	1-1,5	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов	30(1)	10(4)			
			Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	30(2)				
							1	Рожь, ячмень	Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы
	Овес	Злаковые мухи, тли							
	0,5-1	Свекла сахарная и кормовая	Клопы, листовая тля, мини- рующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки						
	0,5-1	Овощные культу- ры (семенные посевы)	Клещи, тли, трипсы, клопы				-(2)		
	2-2,25	Картофель (се- менные посевы)	Тли						
	1,5-2		Картофельная моль						
	0,5-1	Люцерна (семен- ные посевы)	Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи						
	0,5-0,9	Лен-долгунец	Плодожорка, трипсы, совка- гамма				30(2)		
	1,5	Кенаф	Клопы, тли				30(1)		
	1,2-1,6	Смородина (питомники, маточники)	Листовертки, галлицы, тли				-(2)		
	0,6-1,2	Малина (маточники)	Клещи, тли, цикадки, галли- цы						
0,8	Люпин (семенные посевы)	Стеблевая минирующая муха, тли			-(1)				
Данадим, КЭ (400 г/л) Кеминова А/С 3/1 01-077-0144-1 12.2009 Кемидим, КЭ (400 г/л) Кеминова А/С 3/1 01-03013-0144-1 12.2009	0,8-1,2	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	10(4)			
							0,8-1	Рожь, ячмень	Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы
								Овес	Злаковые мухи, тли
	0,7-0,9	Просо	Комарики, тли						
	0,5-0,9	Зернобобовые	Бобовая огневка, гороховая плодожорка, тли						
	1,1-1,9	Яблоня, груша	Щитовки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, медяница, моли, плодожор- ки, листогрызущие гусеницы, жуки	Опрыскивание до и после цветения	40(2)				
			Слива	Клещи, тли, пилильщики	Опрыскивание после цветения		40(1)		
	1,1-2,8	Виноград	Клещи, червецы, листоверт- ки	Опрыскивание в период вегетации	20(2)				

1	2	3	4	5	6	7	
	2,8	Цитрусовые	Белокрылка, червецы, клещи, ложнощитовки, щитовки		40(2)		
	0,5-0,9	Свекла сахарная, свекла кормовая	Клопы, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки		30(2)		
	0,5-0,7	Свекла столовая	Клещи, тли, трипсы, клопы		20(2)		
	0,5-0,9	Овощные (семенные посевы)					
	1,9-2,4	Картофель (семенные посевы)					
	1,4-1,9	Картофельная моль	Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи		30(2)		
	0,5-0,9	Люцерна (семенные посевы)					
	Лен	Плодожорки, трипсы, совка-гамма					
	1,1-1,9	Конопля	Листовертки, тли		30(1)		
	1,4	Кенаф	Клопы, тли				
	2-3	Шелковица	Клещи, червец Комстока	Опрыскивание до и после окончания выкармлики шелковичного червя. Запрещается употреблять ягоды в пищу		30(2)	
	1,1-1,5	Смородина (питомники, маточники)	Листовертки, галлицы, тли		Опрыскивание в период вегетации		
	0,6-1,1	Малина (маточники)	Клещи, тли, цикадки, галлицы				
0,7	Люпин (семенные посевы)	Стеблевая минирующая муха, тли					
0,9-1,1	Лаванда	Цикадки					
1,4-3	Хмель	Совки, тли, луговой мотылек, пилильщики, клещи	13(4)				
0,8-1	Табак, махорка	Трипсы, тли					
(Р) Рогор-С, КЭ (400 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» 3/1 0503-06-101-023-1-1-1-0 25.12.2008	1-1,5	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы				Опрыскивание в период вегетации
	1	Рожь, ячмень	Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы				
		Овес	Злаковые мухи, тли				
	0,7-1	Просо	Комарики, тли				
	0,5-1	Зернобобовые	Бобовая огневка, гороховая плодожорка, тли	Опрыскивание до и после цветения	40(2)		
	0,8-2	Яблоня, груша	Щитовки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, медяница, моли, плодожорки, листогрызущие гусеницы, жуки				
	0,5-0,9	Свекла сахарная	Клопы, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки	Опрыскивание в период вегетации	30(2)		
	0,9	Свекловичная тля	Свекловичная тля				30(1)
	0,6	Горчица	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	
	0,5-1	Овощные (семенные посевы)	Клещи, тли, трипсы, клопы				
	2-2,25	Картофель	Тли	20(2)			
	1,5-2	Картофель (семенные посевы)	Картофельная моль				
	0,5-1	Люцерна (семенные посевы)	Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи	30(2)			
	0,5-0,9	Лен-долгунец	Плодожорки, трипсы, совка-гамма				
	0,8-0,9	Табак	Трипсы, тли				
	1,2-2	Конопля технического назначения	Листовертки, тли				
	1,5	Кенаф	Клопы, тли	30(1)			
	1,2-1,6	Смородина (питомники, маточники)	Листовертки, галлицы, тли	30(2)			
	0,6-1,2	Малина (маточники)	Клещи, тли, цикадки, галлицы				

1	2	3	4	5	6	7		
	0,8	Люпин (семенные посевы)	Стеблевая минирующая муха, тли		30(1)			
(Р) Ди-68, КЭ (400 г/л) ООО «Агрорус XXI», Панама Агрокемикалс Инк. 3/1 0621-07-101-176 (177)-1-1-1-0 12.03.2009	1-1,5	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	10(4)		
	1	Рожь, ячмень	Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы					
		Овес	Злаковые мухи, тли					
	0,5-1	Зернобобовые	Бобовая огневка, гороховая плодоярка, тли	Опрыскивание до и после цветения	40(2)			
	0,8-2	Яблоня, груша	Щитовки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, медяница, моли, плодоярки, листогрызущие гусеницы, жуки					
	0,5-1	Овощные (семенные посевы)	Клещи, тли, трипсы, клопы				- (2)	
	2-2,25	Картофель (семенные посевы)	Тли	Опрыскивание в период вегетации				
	1,5-2		Картофельная моль					
	0,5-1	Люцерна (семенные посевы)	Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи	30(2)				
	0,5-0,9	Лен-долгунец	Плодожорки, трипсы, совка-гамма					
	1,2-2	Конопля (технического назначения)	Листовертки, тли					
	1,5	Кенаф	Клопы, тли	30(1)				
	0,6-1,2	Малина (маточники)	Клещи, тли, цикадки, галлицы	- (2)				
	1,2-1,6	Смородина (питомники, маточники)	Листовертки, галлицы, тли					
0,8	Люпин (семенные посевы)	Стеблевая минирующая муха, тли	- (1)					
(Р) Диметоат-400, КЭ (400 г/л) ООО НПО «РосАгроХим» 3/1 0724-07-101-161-1-1-1-0 09.04.2009	1-1,5	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	10(4)		
	1-1,2	Рожь, ячмень	Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы					
		Овес	Злаковые мухи, тли					
	0,5-1	Свекла сахарная и кормовая	Клопы, листовая тля, минирующая муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки		- (2)			
		Овощные культуры (семенные посевы)	Клещи, тли, трипсы, клопы					
	2-2,25	Картофель (семенные посевы)	Тли		30(2)			
	1,5-2		Картофельная моль					
	0,5-1	Люцерна (семенные посевы)	Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи		30(1)			
	0,5-0,9	Лен-долгунец	Плодожорка, трипсы, совка-гамма					
	1,2-2	Конопля технического назначения	Листовертки, тли					
	1,5	Кенаф	Клопы, тли		- (2)			
	1,2-1,6	Смородина (питомники, маточники)	Листовертки, галлицы, тли					
	0,6-1,2	Малина (маточники)	Клещи, тли, цикадки, галлицы					
	0,8	Люпин (семенные посевы)	Стеблевая минирующая муха, тли		- (1)			
(Р) Бином, КЭ (400 г/л) ООО «Северо-Кавказский	1-1,5	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов	- (1)	10(4)		
			Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	30(2)			

1	2	3	4	5	6	7		
Агрохим» 3/1 0794-07-101-115- 1-1-1-0 22.05.2009	1	Рожь, ячмень	Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы					
		Овес	Злаковые мухи, тли					
	0,5-1	Свекла сахарная и кормовая	Клопы, листовая тля, минирующая муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки					-(2)
		Овощные культуры (семенные посевы)	Клещи, тли, трипсы, клопы					
	2-2,25	Картофель (семенные посевы)	Тли					
	1,5-2		Картофельная моль					
	0,5-1	Люцерна (семенные посевы)	Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи					
	0,5-0,9	Лен-долгунец	Плодожорка, трипсы, совка-гамма				30(2)	
	1,5	Кенаф	Клопы, тли				30(1)	
	1,2-1,6	Смородина (питомники, маточники)	Листовертки, галлицы, тли				-(2)	
	0,6-1,2	Малина (маточники)	Клещи, тли, цикадки, галлицы					
	0,8	Люпин (семенные посевы)	Стеблевая минирующая муха, тли				-(1)	
Тарор, КЭ (400 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» 3/1 1076-08-101-019- 1-0-1-0 13.03.2010	1-1,5	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	10(4)		
	1-1,2	Рожь, ячмень	Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы					
		Овес	Злаковые мухи, тли, пьявицы					
	0,5-1	Овощные культуры (семенные посевы)	Клещи, тли, трипсы, клопы				-(2)	
	2-2,25	Картофель (семенные посевы)	Тли					
	1,5-2		Картофельная моль					
	0,5-1	Люцерна (семенные посевы)	Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи					
	0,5-1	Лен-долгунец	Плодожорки, трипсы, совка-гамма					
	1,5	Кенаф	Клопы, тли	-(1)				
	1,2-3	Виноград	Клещи, червецы, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	28(2)			
	2-3	Шелковица	Клещи, червец Комстока	Опрыскивание до и после окончания выкормки шелковичного червя. Запрещается употреблять ягоды в пищу. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	-(2)			
	1,2-1,6	Смородина (питомники, маточники)	Листовертки, галлицы, тли					
	0,8	Люпин (семенные посевы)	Стеблевая минирующая муха, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)			

Диметоат + бета-циперметрин

(Р) Кинфос, КЭ (300 + 40 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» 3/1 0588-07-101-019- 1-1-1-0 01.03.2009	0,5	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	- (4)
	0,15-0,25		Клоп вредная черепашка			
	0,15-0,2	Ячмень, овес	Пьявица			
		Картофель	Колорадский жук			

Дифлубензурон

Герольд, ВСК (240 г/л)	1,0	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период отрождения личинок. Расход рабочей жидкости -	30(2)	7(3)
	0,5		Моль-малютка			

1	2	3	4	5	6	7
ЗАО Фирма «Август» 3/2 0988-08-101-003- 0-0-2-0 09.01.2018	0,2		Кольчатый шелкопряд, златогузка, боярышница	1000-1500 л/га		
	0,1-0,2	Неплодоносящие сады, декоративные насаждения, лесозащитные полосы	Американская белая бабочка		-(1)	
	0,15	Капуста	Капустная совка, белянки, капустная моль	Опрыскивание в период отрождения личинок. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	
	0,05	Пастбища, луга, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	
(Р) Димилин, СП (250 г/кг) Кромптон Регистрейшнс Лимитед 3/2 0528-07-101-169- 1-1-2-0 23.01.2009	1-2	Яблоня	Яблонная плодоярка	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	7(3)
	0,5		Моль-малютка			
	0,2		Кольчатый шелкопряд, златогузка, боярышница			
	0,1-0,2	Неплодоносящие сады, городские зеленые насаждения, лесозащитные полосы	Американская белая бабочка	Опрыскивание в период вегетации 0,01%-м рабочим раствором	-(2)	
	0,04-0,08	Городские зеленые насаждения	Листогрызущие вредители			
	0,003 кг/м ²	Шампиньоны	Грибные мухи и комарики	Опрыскивание субстрата	25(2)	

Зета-циперметрин

(Р) Фьюри, ВЭ (100 г/л) ФМС Европа НВ 3/1 01-0262-0018-1 12.2014 (Р) Таран, ВЭ (100 г/л) НП ЗАО «Росагросервис» 3/1 01-2249-0190-0 12.2014	0,2-0,3	Яблоня	Плодожорки, листовертки	Опрыскивание в период вегетации	25(2)	7(3)
	0,07-0,1	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица, тли, хлебные жуки, трипсы		20(2)	-(3)
			Пьявица, трипсы		25(2)	
	0,1-0,15	Картофель	Колорадский жук, картофельная коровка		20(2)	7(3)
	0,24-0,36	Виноград	Гроздевая листовертка		30(2)	
	0,1	Рапс, горчица	Рапсовый цветоед		20(2)	-(3)
	0,1-0,15	Капуста	Листогрызущие гусеницы		25(1)	7(3)
		Свекла сахарная	Луговой мотылек		20(1)	
			Свекловичные блошки		20(2)	
	0,15	Люцерна	Фитонемус		20(1)	
	0,1-0,15	Горошек овощной, горох	Тли, гороховая плодоярка, гороховая зерновка		20(2)	
	0,1	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые		20(1)	
	0,07-0,1 (А)	Лиственные и хвойные породы	Хвое- и листогрызущие вредители (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание. Разрешается выпас лактирующего скота через 5 дней, откормочного и молодняка - 3, сбор грибов и ягод - 10, отдых - 4 дня. Сенокосение без ограничений	-(1)	-(3)
	1-1,5мл/ 10 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук, картофельная коровка	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 5 л/100 м ²	20(2)	7(3)
	1,5 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Плодожорки, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	25(2)	
	1 мл/10 л воды (Л)	Капуста	Тли, капустная и репная белянки, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 5 л/100 м ²		

Имидаклоприд

(Р) Танрек, ВРК (200 г/л) ЗАО Фирма «Август» 3/1 0943-07-101-003- 1-1-1-1	0,1-0,15	Пшеница	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	3(3)
	0,2-0,25		Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	

1	2	3	4	5	6	7	
0943-07-101-003-1-1-1-1/01 06.12.2009	0,05-0,075	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости - 200-400л/га	-(1)		
	0,15-0,75	Огурцы защищенного грунта	Тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	1(-)	
	0,5-1,5		Тепличная белокрылка				
	0,5-1,5	Томат защищенного грунта					
	0,3	Цветочные культуры открытого грунта	Тли, цикадки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(1)	3(3)	
	1	Цветочные культуры защищенного грунта	Западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-2000 л/га	-(2)	1(-)	
			Белокрылка, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-2000 л/га			
	5 мл/10 л воды (Л)	Огурцы, томаты защищенного грунта	Тли, тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 3-10 л/ 100 м ²	3(1)	1(-)	
		Цветочные культуры	Тли, цикадки, трипсы, белокрылки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 10л/100 м ²	-(1)	3(3)	
	1 мл/100 м ² (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 5 л/ 100 м ²	20(1)		
3 мл/10 л воды	Яблоня	Тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - от 2 до 5 л на куст (в зависимости от возраста и сорта дерева)	7(1)			
		Яблонный цветоед	Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)				
	Смородина	Тли	Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости - от 0,5 до 1,5 л на куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)				
(Р) Корrado, ВРК (200 г/л) ООО «Ваше хозяйство» 3/1 0812-07-101-212-1-1-1-1 03.06.2009	1 мл/100 м ² (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 5 л/ 100 м ²	20(1)	4(-)	
(Р) Конфидор Экстра, ВДГ (700 г/кг) Байер КрокСайенс АГ 3/1 0676-07-101-010-1-1-1-1 0676-07-101-010-1-1-1-1/01 28.03.2009	0,05	Пшеница	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	3(3)	
	0,03		Трипсы				
			Ячмень				Хлебные блошки, пиявицы
			Овес				Пьявицы
	0,03-0,05	Картофель	Колорадский жук				
	0,15-0,45	Огурцы защищенного грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015%. Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	1(-)	
	0,05-0,2		Тли	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,05-0,008%. Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га			
	0,4		Тли, табачный трипс	Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений - более 1 м			
	0,15-0,45	Томаты защищенного грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015%. Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га			
				Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений - более 1 м			
0,35	Огурцы защищенного грунта	Тли, табачный трипс	Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений - более 1 м				

1	2	3	4	5	6	7
	0,3-0,5 г/ 100 м ² (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 5 л/ 100 м ²	20(1)	3(-)
	1,5 г/10 л воды (Л)	Огурцы, томаты открытого грунта	Белокрылка, тли, табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 1-3 л/ 10 м ²	5(1)	
(Р) Имидж, ВРК (200 г/л) ООО «Агрорус и Ко», Агротрейд Лтд. 3-2/1 0531-07-101-170 (172)-1-1-1-0 23.01.2017	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	20(1)	7(3)
	0,15-0,75	Огурцы защищенного грунта	Тли	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015-0,025%. Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	
	0,5	Томаты защищенного грунта	Белокрылка	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,05%. Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га		
(Р) Имидор, ВРК (200 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» 3-2/1 0516-07-101-019- 1-1-1-0 10.01.2009	0,07	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	28(1)	-(-)
	0,06		Внутрстеблевые мухи		-1(1)	
	0,1	Картофель	Колорадский жук		20(1)	
	0,25	Картофель (се- менные посевы)	Тли	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя	-3(1)	
	0,15-0,75	Огурцы защищенного грунта	Белокрылка	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015-0,025%	3(1)	1(-)
	0,5-1,5	Томаты защищен- ного грунта		Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,05%		
(Р) Табу, ВСК (500 г/л) ЗАО Фирма «Август» 3/- 0527-07-101-003- 1-1-0-0 23.01.2009	0,8-1	Лен-долгунец	Блошки	Обработка семян	-1(1)	-(-)
	10-13	Свекла сахарная	Комплекс вредителей всходов	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) или фракции 4,5-5,5 мм		
	12-15			Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) или фракции 3,5-4,5 мм		
(Р) Искра Золотая, ВРК (200 г/л) ЗАО «ТПК Техноэкспорт» 3/1 0533-07-101-035- 1-1-1-1 23.01.2009	0,5-1,5	Огурцы защищен- ного грунта	Тепличная белокрылка, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации 0,05-0,15%-м рабочим раствором	3(1)	1(-)
		Томаты защищен- ного грунта			5(1)	
	2	Кукуруза (толь- ко на зерно)	Проволочники	Обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-1(1)	-(-)
		Подсолнечник (кроме зеленого корма)				
	1 мл/5 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м ²	20(1)	3(-)
	5 мл/10 л воды (Л)	Огурцы защищен- ного грунта	Белокрылка, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м ²	3(1)	1(-)
		Томаты защищен- ного грунта			5(1)	
(Р) Искра Золотая, ТАБ (25 г/кг) ЗАО «ТПК Техноэкспорт» 3/1 0616-07-101-035- 1-1-1-1 12.03.2009	1 таб/5 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м ²	20(1)	3(-)
	5 таб/10 л воды (Л)	Огурцы защищенного грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м ²	3(1)	1(-)
	2 таб/10 л воды (Л)		Тли			
	5 таб/10 л воды (Л)	Томаты защищен- ного грунта	Тепличная белокрылка		5(1)	
(Р) Искра Золотая, П (25 г/кг) ЗАО «ТПК Техноэкспорт» 3/1 0616-07-101-035- 1-1-1-1 12.03.2009	8 г/5 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м ²	20(1)	3(-)

1	2	3	4	5	6	7
(Р) Зубр, ВРК (200 г/л) ООО «Фирма «Зеленая Аптека Садовода» 3/1 0675-07-101-030-1-1-1-1 28.03.2009	1 мл/100 м ² (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м ²	20(1)	3(-)
	1 мл/10 л воды (Л)	Горшечные и цветочные растения	Тли, цикадки, трипсы, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 10 л/100 м ²	-(1)	
(Р) Командор Макси, ВДГ (700 г/кг) ЗАО «ТПК Техноэкспорт» 3/1 0484-06-101-035-1-1-1-1 06.12.2008	0,3 г/5 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 5 л/100 м ²	20(1)	3(-)
	1,5 г/10 л воды (Л)	Огурцы открытого и защищенного грунта	Белокрылка, тли, табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1-3 л/м ²	3(1)	3(-) 1(-)
		Томаты открытого и защищенного грунта			5(1)	3(-) 1(-)
(Р) Командор, ВРК (200 г/л) ЗАО «ТПК Техноэкспорт» 3/1 0480-06-101-035-1-1-1-1 06.12.2008	0,5-1,5	Огурцы защищенного грунта	Тепличная белокрылка, тли трипсы	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,05%	3(1)	1(-)
		Томаты защищенного грунта			5(1)	
	2	Кукуруза (на зерно)	Проволочники	Обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	
		Подсолнечник (кроме зеленого корма)				
	1 мл/5 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м ²	20(1)	3(-)
	5 мл/10 л воды (Л)	Огурцы защищенного грунта	Тепличная белокрылка, тли трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м ²	3(1)	
		Томаты защищенного грунта			5(1)	
	10 мл/10 л воды (Л)	Цветочные культуры	Тли, калифорнийский трипс		-(1)	
Конфидор, ВРК (200 г/л) Байер КрокСайенс АГ 3/1 1073-08-101-010-1-0-1-1 13.03.2010	0,5-1,5	Огурец, томат защищенного грунта	Белокрылка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	1(-)
	1,5	Томат защищенного грунта	Тли, тепличная белокрылка	Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений - более 1 м. Расход рабочей жидкости - 2400-3000 л/га		
				Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений - менее 1 м. Расход рабочей жидкости - 2400-3000 л/га		
	1,5	Огурец защищенного грунта	Тли, табачный трипс	Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений - более 1 м. Расход рабочей жидкости - 2400-3000 л/га		
				Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений - менее 1 м. Расход рабочей жидкости - 2400-3000 л/га		
	1,25-1,5		Табачный трипс	Внесение в почву с водой. Расход рабочей жидкости - 3000 л/га		
	0,15-0,75		Тли	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015-0,025%. Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га		
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	3(3)
	0,25	Картофель (семенные посевы)	Тли		-(3)	
	0,05-0,075	Пастбища	Саранчовые	Опрыскивание в период развития	20(1)	

1	2	3	4	5	6	7
				личинки. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га		
	1 мл/100 м ² (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей. Расход рабочей жидкости - до 5 л/100 м ²	20(1)	1(-)

Имдаклоприд + бета-цифлутрин

(Р) Чинук, СК (100 + 100 г/л) Байер КрокСайенс АГ 2/- 0672-07-101-010-0-1-0-0 28.03.2017	20	Рапс	Крестоцветные блошки	Обработка семян	-(1)	-(-)
---	----	------	----------------------	-----------------	------	------

Индоксакарб

Авант, КС (150 г/л) ООО «Дюпон Наука и Технологии» 3/1 1105-08-101-276-0-0-1-0 30.03.2018	0,35-0,4	Яблоня	Яблонная плодовая жук, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	10(3)	10(4)
	0,25-0,3	Виноград	Листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(3)	

Карбосульфат

(Р) Маршал, СП (250 г/кг) ФМС Европа НВ 3/1 01-0167-0018-0 12.2013	0,5-1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	21(1)	10(4)
---	-------	-----------	-----------------	---------------------------------	-------	-------

Карбофуран

(Р) Адикур, ТПС (350 г/л) Сер-Италия С.р.л 1/- 01-0173-0016-1 12.2011	25-30	Свекла сахарная	Комплекс почвообитающих и наземных вредителей	Обработка семян на семенных заводах перед посевом или заблаговременно, но не ранее чем за 6 месяцев до посева (для фракций 4,5-5,5 мм и для дражированных)	-(1)	-(-)
	30-35			Обработка семян на семенных заводах перед посевом или заблаговременно, но не ранее чем за 6 месяцев до посева (для фракций 3,4-4,5 мм и для дражированных)		
	30	Свекла кормовая		Обработка семян на семенных заводах перед посевом или заблаговременно, но не ранее чем за 6 месяцев до посева		
(Р) Фурадан, ТПС (350 г/л) ФМС Европа НВ 1/- 01-0030-0018-1 12.2014	25-30	Свекла сахарная	Комплекс почвообитающих и наземных вредителей	Обработка семян на семенных заводах перед посевом или заблаговременно, но не ранее чем за 6 месяцев до посева (для фракций 4,5-5,5 мм и для дражированных)	-(1)	-(-)
	30-35			Обработка семян на семенных заводах перед посевом или заблаговременно, но не ранее чем за 6 месяцев до посева (для фракций 3,4-4,5 мм и для дражированных)		
	30	Свекла кормовая		Обработка семян на семенных заводах перед посевом или заблаговременно, но не ранее чем за 6 месяцев до посева		
	15	Горчица, рапс	Блошки	Обработка семян на специальных установках перед посевом		
	12-15	Рапс	Крестоцветные блошки			
(Р) Хинифур, КС (436 г/л) Агро-Кеми Кфт. 1/- 0452-06-107-148-0-1-0-0 02.11.2016	12-18	Свекла сахарная, кормовая	Комплекс почвообитающих и наземных вредителей	Обработка семян на семенных заводах перед посевом или заблаговременно, но не ранее чем за 6 месяцев до посева для Центрально-Черноземной зоны. Обработка семян на семенных заводах перед посевом или заблаговременно, но не ранее чем за 6 месяцев до посева	-(1)	-(-)
	15-18,1					

1	2	3	4	5	6	7
				(13,1-12,6 г д.в./100 тыс. семян при массе 1000 семян 20-16 г)		
	18,3-21,6			Для Центрально-Черноземной зоны. Обработка семян на семенных заводах перед посевом или заблаговременно, но не ранее чем за 6 месяцев до посева (12,8-9,4 г д.в./100 тыс. семян при массе 1000 семян 16-12 г и менее)		
	18,4-20,1			Для Южных регионов свеклосеяния с жесткими климатическими условиями. Обработка семян на семенных заводах перед посевом или заблаговременно, но не ранее чем за 6 месяцев до посева (16-14 г д.в./ 100 тыс. семян при массе 1000 семян 20-16 г)		
	20,1-23			Для Южных регионов свеклосеяния с жесткими климатическими условиями. Обработка семян на семенных заводах перед посевом или заблаговременно, но не ранее чем за 6 месяцев до посева (14-12 г д.в./ 100 тыс. семян при массе 1000 семян 16-12 г)		

Люфенурон

Матч, КЭ (50 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ 3/3 01-0185-0497-0 12.2013 * - до 09.02.2006	1	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в начале яйцекладки	30(2)	7(3)
	0,3	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период появления личинок первого возраста. Для Южных регионов - в период массовой яйцекладки	14(1)	
	0,15	*Пастбища, дикая растительность, участки заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личиночной фазы развития	30(1)	

Лямбда-цигалотрин

(Р) Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) ООО «Сингента» 3/1 0980-07-101-018-0- 1-1-0 25.12.2017	0,2	Пшеница	Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости : при назем- ном опрыскивании - 200-400 л/га, при авиационном - 25-50 л/га	40(1)	10(4)
	0,15		Клоп вредная черепашка, тли, пьявица		40(2)	
	0,15 (А)				40(1)	
	0,1				40(2)	
	0,15-0,2	Ячмень	Мухи, пьявица, цикадки, трипсы, стеблевые пилиль- щики, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	
	0,15-0,2 (А)				40(1)	
	0,2-0,3	Кукуруза (на зерно)	Хлопковая совка		40(1)	
	0,2-0,3 (А)		Кукурузный мотылек		40(2)	
	0,2					
	0,1-0,125	Горох	Гороховый комарик, тли, трипсы, клубеньковые долго- носики		30(1)	
	0,4	Соя	Паутинный клещ		40(1)	
	0,1	Горчица	Рапсовый цветоед		30(1)	
	0,1-0,15	Рапс			20(2)	
	0,4	Яблоня	Плодожорки, листовертки, клещи		Опрыскивание в период вегетации. Рас- ход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	20(1)
	0,1-0,15		Яблонный цветоед		Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	
	0,4	Вишня (маточники)	Паутинный клещ, тли, листо- вертки		Опрыскивание в период вегетации. Рас- ход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	-(2)
	0,5	Земляника (маточники)			Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	
	0,4	Малина (маточники)			Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	
	0,3-0,4	Смородина (маточники)				
0,3	Крыжовник (маточники)	Паутинный клещ, тли, пи- лильщики	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)		
0,1	Капуста	Капустная совка, капустная белянка, капустная моль, крестоцветные блошки				

1	2	3	4	5	6	7
		Томат	Колорадский жук			
	0,4		Хлопковая совка		30(2)	
	0,15-0,2	Лук	Табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации.	25(2)	
	0,3-0,4		Луковая муха	Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га		
	0,1-0,2	Морковь	Морковная листовёртка	Опрыскивание в период вегетации.	30(1)	
	0,2-0,25		Морковная муха	Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га		
	0,2-0,4	Неплодоносящие сады, лесозащитные полосы	Американская белая бабочка	Опрыскивание в период вегетации.	- (2)	
	0,1-0,15	Лен-долгунец	Блошки	Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га. Срок для сбора дикорастущих грибов и ягод - 30 дней		
	0,15	Люцерна	Клопы, тли, долгоносики, листовёртки, толстоножка люцерновая	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(2)	
			Свекла сахарная	Опрыскивание в период вегетации.	20(1)	
			Свекловичные блошки, долгоносики	Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га		
	0,15 -0,2		Тли	Опрыскивание в период вегетации.		
			Луговой мотылек	Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га		
	0,1-0,15	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые нестатные	Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 200-400 л/га, при авиационном - 25-50 л/га. Срок для сбора дикорастущих грибов и ягод - 30 дней	- (1)	
	0,1-0,15 (А)		Саранчовые стадные (личинки младших возрастов)			
	0,2-0,4		Саранчовые стадные (личинки старших возрастов)			
	0,2-0,4 (А)					
	0,4 мл/м ²	Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий	Вредители запасов	Опрыскивание. Расход - до 50 мл/м ² . Допуск людей и загрузка складов через 3 суток после обработки	- (-)	- (-)
	0,8 мл/м ²	Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах		Опрыскивание. Расход - до 200 мл/м ²		
(Р) Гладиатор, КЭ (50 г/л) ООО АНПП «Агрохим XXI» 3/2 0968-07-101-161-1-1-2-0 16.12.2009	0,2	Пшеница	Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки	Опрыскивание в период вегетации	20(1)	- (4)
	0,15		Клоп вредная черепашка, тли		20(2)	
	0,15-0,2	Ячмень	Мухи, пьявица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли			
	0,1	Горчица	Рапсовый цветоед		30(1)	
	0,4	Яблоня	Плодожорки, листовёртки, клещи		30(2)	
			Паутинный клещ, тли, листовёртки		- (2)	
	0,5	Земляника (маточники)				
	0,4	Малина (маточники)				
	0,3-0,4	Смородина (маточники)				
	0,3	Крыжовник (маточники)	Паутинный клещ, тли, пилильщики			
	0,1	Картофель	Колорадский жук		30(2)	
	0,2-0,4	Неплодоносящие сады	Американская белая бабочка	Опрыскивание в период вегетации	- (2)	
	0,32-0,48	Виноград	Листовёртки, клещи		30(2)	
	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед		20(2)	
		Лен-долгунец	Блошки	Опрыскивание всходов	- (2)	
	0,15	Люцерна	Клопы, тли, долгоносики, листовёртки, толстоножка люцерновая	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	

1	2	3	4	5	6	7
		Свекла сахарная	Свекловичные блошки, тли, долгоносики	Опрыскивание в фазе «вилочки»	20(1)	
	0,1-0,15	Пастбища, участ- ки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые нестадные	Опрыскивание в период развития личинок	30(1)	
	0,4		Саранчовые стадные			
(Р) Алтын, КЭ (50 г/л) ООО «Агровит» 3/1 0821-07-101-180-1- 1-1-0 14.06.2009	0,2	Пшеница	Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки	Опрыскивание в период вегетации	20(1)	-(4)
	0,15		Клоп вредная черепашка, тли, пьявица		20(2)	
	0,15-0,2	Ячмень	Мухи, пьявица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли			
	0,1	Горчица	Рапсовый цветоед		30(1)	
	0,4	Вишня (маточники)	Паутинный клещ, тли, листовертки		-(2)	
	0,5	Земляника (маточники)				
	0,4	Малина (маточники)				
	0,3-0,4	Смородина (маточники)				
	0,3	Крыжовник (маточники)	Паутинный клещ, тли, пилильщики			
	0,1	Картофель	Колорадский жук		30(2)	
	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед		20(2)	
	0,15	Люцерна	Клопы, тли, долгоносики, листоблошки, толстоножка люцерновая		30(2)	
		Свекла сахарная	Свекловичные блошки, тли, долгоносики	Опрыскивание в фазе «вилочки»	20(1)	
	0,1-0,15	Пастбища, участ- ки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые нестадные	Опрыскивание в период развития личинок	30(1)	
	0,4		Саранчовые стадные (личинки младших возрастов)			
(Р) Лямбда-С, КЭ (50 г/л) ООО «АгроХим» 3/1 0816-07-101-214-1- 1-1-0 14.06.2009	0,2	Пшеница	Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки	Опрыскивание в период вегетации	20(1)	-(4)
	0,15		Клоп вредная черепашка, тли, пьявица		20(2)	
	0,15-0,2	Ячмень	Мухи, пьявица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли			
	0,1	Горчица	Рапсовый цветоед		30(1)	
	0,4	Вишня (маточники)	Паутинный клещ, тли, листовертки		-(2)	
	0,5	Земляника (маточники)				
	0,4	Малина (маточники)				
	0,3-0,4	Смородина (маточники)				
	0,3	Крыжовник (маточники)	Паутинный клещ, тли, пилильщики			
	0,1	Картофель	Колорадский жук		30(2)	
	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед		20(2)	
	0,15	Люцерна	Клопы, тли, долгоносики, листоблошки, толстоножка люцерновая	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	
		Свекла сахарная	Свекловичные блошки, тли, долгоносики	Опрыскивание в фазе «вилочки»	20(1)	
	0,1-0,15	Пастбища, участ- ки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые нестадные	Опрыскивание в период развития личинок	30(1)	
	0,4		Саранчовые стадные (личинки младших возрастов)			
			Саранчовые стадные (личинки старших возрастов)			

1	2	3	4	5	6	7
(Р) Молния, КЭ (50 г/л) ЗАО «ТПК Техноэкспорт» 3/2 0468-06-101-035- 0-1-2-1 03.12.2016	2 мл/10 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м²	30(1)	3(-)
		Капуста	Капустная совка, белянки, капустная моль, крестоцветные блошки			
		Цветочные и декоративные культуры	Комплекс вредителей			
(Р) Кунгфу, КЭ (50 г/л) ООО «Агрорус и Ко», АгроТрейд Лтд. 3/1 0700-07-101-170 (172)-1-1-1-0 02.04.2009	0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка, тли, пядица	Опрыскивание в период вегетации	20(2)	7(4)
	0,15-0,2	Ячмень	Мухи, пядица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли		30(1)	
	0,1-0,125	Горох	Гороховый комарик, тли, трипсы, клубеньковые долгоносики			
	0,1	Горчица	Рапсовый цветоед			
	0,4	Вишня (маточники)	Паутинный клещ, тли, листовертки			
	0,5	Земляника (маточники)				
	0,4	Малина (маточники)				
	0,3-0,4	Смородина (маточники)				
	0,3	Крыжовник (маточники)	Паутинный клещ, тли, пилильщики			
	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед		20(2)	
		Лен-долгунец	Блошки	Опрыскивание всходов	-(2)	
	0,15	Люцерна	Клопы, тли, долгоносики, листоблошки, толстоножка люцерновая	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	
		Свекла сахарная	Свекловичные блошки, тли, долгоносики	Опрыскивание в фазе «вилочки»	20(1)	
	0,1-0,15	Пастбища, участ- ки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые нестатные	Опрыскивание в период развития личинок	30(1)	
	0,4		Саранчовые стадные (ли- чинки младших возрастов) Саранчовые стадные (личинки старших возрастов)			
(Р) Брейк, МЭ (100 г/л) ЗАО Фирма «Август» 2/2 0761-07-101-003- 1-1-2-0 09.05.2009	0,1	Пшеница	Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки	Опрыскивание в период вегетации	20(1)	7(3)
	0,07		Клоп вредная черепашка, тли, пядица		20(2)	
	0,07-0,1	Ячмень	Мухи, пядица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли		30(1)	
	0,05-0,06	Горох (на зерно)	Гороховая плодоярка, гороховая зерновка, гороховый комарик, тли, трипсы, клубеньковые долгоносики			
	0,05	Горчица (кроме горчицы на масло)	Рапсовый цветоед			
	0,2	Вишня (маточники)	Паутинный клещ, тли, листовертки		-(2)	
	0,25	Земляника (маточники)				
	0,2	Малина (маточники)				
	0,15-0,2	Смородина (маточники)				
	0,15	Крыжовник (маточники)	Паутинный клещ, тли, пилильщики			
	0,1-0,2	Неплодоносящие сады	Американская белая бабочка		-(2)	
	0,05-0,07	Рапс	Рапсовый цветоед	20(2)		
		Лен-долгунец	Блошки	Опрыскивание всходов	-(2)	

1	2	3	4	5	6	7
	0,07	Люцерна	Клопы, тли, долгоносики, листоблошки, толстоножка люцерновая	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	
		Свекла сахарная	Свекловичные блошки, тли, долгоносики	Опрыскивание всходов	20(1)	
(Р) Брестер, КЭ (50 г/л) ООО «АЛСИКО-АГРОПРОМ» 3/1 1078-08-101-036-1-1-1-0 13.03.2010	0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка, тли, пядица	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(3)
	0,15-0,2	Ячмень	Мухи, пядица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли			
	0,2	Кукуруза (на зерно)	Луговой мотылек, кукурузный мотылек		30(1)	
	0,1-0,125	Горох (кроме овощного)	Гороховый комарик, тли, трипсы, клубеньковые долгоносики			
	0,4	Вишня (маточники)	Паутинный клещ, тли, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	-(2)	
	0,5	Земляника (маточники)		Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га		
	0,3-0,4	Смородина (маточники)		Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га		
	0,3	Крыжовник (маточники)	Паутинный клещ, тли, пилильщики			
	0,15	Люцерна	Клопы, тли, долгоносики, листоблошки, толстоножка люцерновая	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га		
	0,2	Неплодоносящие сады	Американская белая бабочка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га		
(Р) Карачар, КЭ (50 г/л) ООО «Северо-Кавказский Агрохим» 3/1 1081-08-101-115-1-1-1-0 13.03.2010	0,2	Пшеница	Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки	Опрыскивание в период вегетации	20(1)	-(4)
	0,15		Клоп вредная черепашка, тли, пядица		20(2)	
	0,15-0,2	Ячмень	Мухи, пядица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли			
	0,1	Горчица	Рапсовый цветоед		30(1)	
	0,4	Яблоня	Плодожорки, листовертки, клещи		30(2)	
		Вишня (маточники)	Паутинный клещ, тли, листовертки		-(2)	
	0,5	Земляника (маточники)				
	0,4	Малина (маточники)				
	0,3-0,4	Смородина (маточники)				
	0,3	Крыжовник (маточники)	Паутинный клещ, тли, пилильщики			
	0,1	Картофель	Колорадский жук		30(2)	
	0,2-0,4	Неплодоносящие сады	Американская белая бабочка		-(2)	
	0,32-0,48	Виноград	Листовертки, клещи		30(2)	
	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед		20(2)	
		Лен-долгунец	Блошки	Опрыскивание всходов	-(2)	
	0,15	Люцерна	Клопы, тли, долгоносики, листоблошки, толстоножка люцерновая	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	
		Свекла сахарная	Свекловичные блошки, тли, долгоносики	Опрыскивание в фазе «вилочки»	20(1)	
	0,1-0,15	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые нестадные	Опрыскивание в период развития личинок	30(1)	
			Саранчовые стадные (личинки младших возрастов)			
	0,2-0,4		Саранчовые стадные (личинки старших возрастов)			

1	2	3	4	5	6	7	
Малатион							
(Р) Бунчук, КЭ (500 г/л) ООО «Лазорик-Дон» 3/1 1046-08-101-272-1-1-1-0 10.02.2010	0,5-1,2	Пшеница	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	20(1)	10(4)	
	0,4-0,8	Лен (для техниче-ских целей)	Льняная плодoжорка, совка-гамма, льняной трипс		-(2)		
	0,2-0,6	Люцерна (семен-ные посевы)	Клопы, тли, толстоножки, долгоносики, луговой моты-лек, совки, огневки, галлицы				
		Клевер (семенные посевы)					
		Эспарцет (семен-ные посевы)					
	0,6-0,8	Горчица (кроме масла)	Клопы, листоеды, капустная моль, пилильщики, цветоеды		20(2)		
0,6-1	Кориандр	Клещи, тли, листоеды, совки, луговой мотылек					
(Р) Новактион, ВЭ (440 г/л) Кеминова А/С 3/1 0514-07-101-029-1-1-1-0 10.01.2009	0,7-1,6	Зерновые культуры	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	20(1)	10(4)	
		Кукуруза	Тля листовая, цикадки		20(2)		
		Горох	Гороховая зерновка, тли		Опрыскивание при массовой яйцекладке		
	1,3-1,6	Свекла сахарная	Клопы, минирующие муха и моль, цикадки, листовая тля	Опрыскивание в период вегетации			
	0,5-1	Лен	Льняная плодoжорка, совка-гамма, льняной трипс				
		1,3	Яблоня, груша, айва				Клещи, тли, долгоносики, плодoжорки, листовертки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки
			Вишня, черешня, слива	Тли, долгоносики, плодoжорки, пилильщики, вишневая муха			
	Неплодоносящие сады		Клещи, тли, листовертки, медяница, моли	-(4)			
	1,3-3,4	Смородина	Тли, моль почковая, листовая и побеговая, галлицы, листовертки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки		20(2)		
		Крыжовник	Пилильщики, листовертки, огневки, пяденицы				
		Малина	Малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, клещи, малинная почковая моль, тли		Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. В питомниках и маточниках без ограничений		-(2)
	1,3-2,3	Земляника	Белокрылка, малинно-земляничный долгоносик, пилильщики, клещи	Опрыскивание в период вегетации	20(2)		
	1,3	Виноград	Клещи, мучнистый червец				
	0,8-1,6	Капуста	Белянки, совки, моли, тли, трипсы, белокрылка				
		Огурцы открытого грунта	Клещи, ростковая муха, тли, трипсы, белокрылка				
		Томаты открытого грунта	Клещи, тли, белокрылка				
	3,1-4,7	Огурцы защищен-ного грунта	Клещи, трипсы, тепличная белокрылка		5(1)		
		Томаты защищен-ного грунта	Клещи, трипсы, тепличная белокрылка, пасленовая минирующая муха		5(3)		
	0,5	Дыня, арбуз	Дынная муха, клещи, тли, бахчевая коровка		20(2)		
	0,3-0,8	Люцерна (семен-ные посевы)	Клопы, тли, толстоножки, долгоносики, луговой мотылек, совки, огневки, галлицы				30(2)
		Клевер (семенные посевы)					
		Эспарцет (семен-ные посевы)					
	1,3-2,3	Табак, махорка	Клопы, тли, трипсы		7(2)		

1	2	3	4	5	6	7	
	2,3-7,8	Хмель	Листогрызущие гусеницы, пилильщики, клещи, тли		20(2)		
	0,8-1	Подсолнечник	Клопы, тли				
		Горчица, рапс	Клопы, листоеды, капустная моль, пилильщики, цветоеды				
	0,8-1,3	Соя, кунжут, кориандр	Клещи, тли, листоеды, совки, луговой мотылек				
	4,7-6,2	Цитрусовые	Клещи, белокрылка, червецы, щитовка				
		Чай	Чайная моль, тли				
	-	Плодовые, ягодные	Вредные насекомые, клещи	Погружение саженцев в 1-2%-й рабочий раствор	-(1)		
		Вишня, малина, облепиха		Погружение зеленых черенков на 1 мин в 0,3%-й рабочий раствор			
1,3-1,8	Облепиха (школка)	Галловый клещ, медяница, тли	Опрыскивание в период вегетации	-(3)			
0,8-1,8/100 л воды	Облепиха (саженцы)	Галловый клещ	Обработка саженцев водной эмульсией препарата с последующим томлением в течение 24-48 ч	-(1)			
(Р) Фуфанон, КЭ (570 г/л) Кеминова А/С 3/3 01-0032-0144-1 12.2013	0,5-1,2	Зерновые культуры	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	20(1)	-(4)	
		Кукуруза	Тля листовая, цикадки		20(2)	10(4)	
		Горох	Бобовая огневка, гороховая плодоярка	Опрыскивание при массовой яйцекладке		-(4)	
			Гороховая зерновка, тли	Опрыскивание в период вегетации			
	1-1,2	Свекла сахарная	Клопы, минирующие муха и моль, цикадки, листовая тля			10(4)	
	0,4-0,8	Лен	Льняная плодоярка, совка-гамма, льняной трипс			-(4)	
	1	Яблоня, груша, айва	Клещи, тли, долгоносики, плодоярки, листовертки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки			10(4)	
		Вишня, черешня, слива	Тли, долгоносики, плодоярки, пилильщики, вишневая муха				
		Неплодоносящие сады	Клещи, тли, листовертки, медяница, моли		-(4)		
	1-2,6	Смородина	Тли, моли, галлицы, листовертки, пилильщики, щитовки, ложнощитовки			20(2)	
		Крыжовник	Пилильщики, листовертки, огневки, пяденицы				
		Малина	Малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, клещи, малинная почковая моль, тли	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. В питомниках и маточниках без ограничений	-(2)		
	1-1,8	Земляника	Белокрылка, малинно-земляничный долгоносик, пилильщики, клещи	Опрыскивание в период вегетации	20(2)		
	1	Виноград	Клещи, мучнистый червец				
	0,6-1,2	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль, мухи, тли, трипсы, белокрылка				
		Огурцы открытого грунта	Клещи, ростковая муха, тли, трипсы, белокрылка				
	2,4-3,6	Огурцы защищенного грунта	Клещи, трипсы, тепличная белокрылка, тли		5(1)	2(-)	
	0,6-1,2	Томаты открытого грунта	Клещи, тли, белокрылка		20(2)	10(4)	
2,4-3,6	Томаты защищенного грунта	Клещи, тли, тепличная белокрылка, пасленовая минирующая муха	5(3)		2(-)		
0,4	Дыня, арбуз	Дынная муха, клещи, тли, бахчевая коровка	20(2)		10(4)		
0,2-0,6	Люцерна, клевер,	Клопы, тли, толстоножки,					

1	2	3	4	5	6	7
* - до 16.02.2006		эспарцет (семенные посевы)	долгоносики, луговой мотылек, совки, огневки, галлицы		7(2)	
	1-1,8	Табак, махорка	Клопы, тли, трипсы			
	0,6-0,8	*Подсолнечник	Клопы, тли			
		*Горчица	Клопы, листоеды, капустная моль, пилильщики, цветоеды			
	0,6-1	*Соя, арахис, кунжут, кориандр	Клещи, тли, листоеды, совки, луговой мотылек			
	0,6-1,4	*Мак масличный	Скрытнохоботники корневой и коробочный, тли, листовертки, галлица, клещи, луговой мотылек			
	2-3	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок		
	-	Плодовые, ягодные	Вредные насекомые, клещи	Погружение саженцев в 1-2%-й рабочий раствор	-(1)	-(-)
		Вишня, малина, облепиха		Погружение зеленых черенков на 1 мин в 0,3%-й рабочий раствор		
	1-1,4	Облепиха (школка)	Галловый клещ, медяница, тли	Опрыскивание в период вегетации	-(3)	-(2)
0,6-1,2/100 л воды	Облепиха (саженцы)	Галловый клещ	Обработка саженцев водной эмульсией препарата с последующим томлением в течение 24-48 ч	-(1)		
0,8 мл/м ²	Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий	Вредители запасов	Опрыскивание. Расход - до 50 мл/м ² . Допуск людей и загрузка складов после проветривания в течение 1 суток	-(-)	1(1)	
1,6 мл/м ²	*Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах		Опрыскивание. Расход - до 200 мл/м ²		-(-)	
12-30 мл/т	Зерно продовольственное фуражное и семена бобовых культур		Опрыскивание. Расход - до 500 мл/т. Допуск людей после проветривания в течение 1 суток. Использование зерна на фуражные и продовольственные цели при содержании остатков препарата не выше МДУ			
0,6 мл/м ²	Мука, крупа в мешках		Опрыскивание. Расход - до 50 мл/м ² . Допуск людей после проветривания в течение 1 суток			
10 мл/10 л воды (Л)	Яблоня, груша, айва	Клещи, тли, долгоносики, плодожорки, листовертки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки	Опрыскивание в период вегетации. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	20(2)	10(4)	
	Вишня, черешня, слива	Тли, долгоносики, плодожорки, пилильщики, вишневая муха, шелкопряды, моли, листоеды, пяденицы, щитовки				
	Смородина	Тли, моли, галлицы, листовертки, пилильщики, щитовки, ложнощитовки	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 1-1,5 л/куст			
	Крыжовник	Пилильщики, листовертки, огневки, пяденицы				
	Малина	Малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, клещи, малинная почковая моль, тли	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. Расход - до 2 л/10 кустов	-(2)		
	Виноград	Клещи, мучнистый червец	Опрыскивание в период вегетации. Расход - от 2 до 5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)	20(2)		

1	2	3	4	5	6	7
		Цитрусовые	Клещи, белокрылка, червецы, щитовки	Опрыскивание в период вегетации. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)		
		Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль, мухи, тли, трипсы, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 1 л/10 м ²	5(1)	2(-)
		Огурцы и томаты защищенного грунта	Клещи, трипсы, тепличная белокрылка, пасленовая минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 1-3 л/10 м ²	20(2)	
	10 мл/5 л воды (Л)	Огурцы и томаты открытого грунта	Клещи, ростковая муха, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 5 л/10 м ²		
	5 мл/5 л воды (Л)	Дыня, арбуз	Дынная муха, клещи, тли, бахчевая коровка			
	15 мл/5 л воды (Л)	Земляника	Малинно-земляничный долгоносик, пилильщики, клещи			
	10 мл/10 л воды (Л)	Цветочные культуры, декоративные кустарники	Комплексы вредителей	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 1,5 л/10 м ²		
(Р) Кемифос, КЭ (570 г/л) Кеминова А/С 3/3 01-03014-0144-1 12.2013	0,5-1,2	Зерновые культуры	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	20(1)	-(4)
		Кукуруза	Тля листовая, цикадки		20(2)	10(4)
		Горох	Бобовая огневка, гороховая плодожорка			-(4)
			Гороховая зерновка, тли	Опрыскивание в период вегетации		
	1-1,2	Свекла сахарная	Клопы, минирующие муха и моль, цикадки, листовая тля			10(4)
	0,4-0,8	Лен	Льняная плодожорка, совка-гамма, льняной трипс			-(4)
	1	Яблоня, груша, айва	Клещи, тли, долгоносики, плодожорки, листовертки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки			10(4)
		Вишня, черешня, слива	Тли, долгоносики, плодожорки, пилильщики, вишневая муха		20(2)	
		Неплодоносящие сады	Клещи, тли, листовертки, медяница, моли		-(4)	
	1-2,6	Смородина	Тли, моли, галлицы, листовертки, пилильщики, щитовки, ложнощитовки		20(2)	
		Крыжовник	Пилильщики, листовертки, огневки, пяденицы			
		Малина	Малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, клещи, малинная почковая моль, тли	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. В питомниках и маточниках без ограничений	-(2)	
	1-1,8	Земляника	Белокрылка, малинно-земляничный долгоносик, пилильщики, клещи	Опрыскивание в период вегетации	20(2)	
	1	Виноград	Клещи, мучнистый червец			
	0,6-1,2	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль, мухи, тли, трипсы, белокрылка			
		Огурцы открытого грунта	Клещи, ростковая муха, тли, трипсы, белокрылка			
	2,4-3,6	Огурцы защищенного грунта	Клещи, трипсы, тепличная белокрылка, тли		5(1)	2(-)
	0,6-1,2	Томаты открытого грунта	Клещи, тли, белокрылка		20(2)	10(4)
	2,4-3,6	Томаты защищенного грунта	Клещи, тли, тепличная белокрылка, пасленовая минирующая муха		5(3)	2(-)
	0,4	Дыня, арбуз	Дынная муха, клещи, тли, бахчевая коровка		20(2)	10(4)

1	2	3	4	5	6	7	
* - до 16.02.2006	0,2-0,6	Люцерна (семенные посевы)	Клопы, тли, толстоножки, долгоносики, луговой мотылек, совки, огневки, галлицы		30(2)	-(4)	
		Клевер (семенные посевы)					
		Эспарцет (семенные посевы)					
	1-1,8	Табак, махорка	Клопы, тли, трипсы		7(2)	10-13(4)	
	0,6-0,8	Подсолнечник	Клопы, тли		20(2)	10(4)	
		Горчица	Клопы, листоеды, капустная моль, пилильщики, цветоеды				
	0,6-1	*Соя, арахис, кунжут, кориандр	Клещи, тли, листоеды, совки, луговой мотылек				
	0,6-1,4	Мак масличный	Скрытнохоботники корневой и коробочный, тли, листовертки, галлица, клещи, луговой мотылек				
	2-3	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок			
	-	Плодовые, ягодные	Вредные насекомые, клещи	Погружение саженцев в 1-2%-й рабочий раствор	-(1)	-(-)	
		Вишня, малина, облепиха		Погружение зеленых черенков на 1 мин в 0,3%-й рабочий раствор			
	1-1,4	Облепиха (школка)	Галловый клещ, медяница, тли	Опрыскивание в период вегетации	-(3)	-(2)	
	0,6-1,2/100 л воды	Облепиха (саженцы)	Галловый клещ	Обработка саженцев водной эмульсией препарата с последующим томлением в течение 24-48 ч	-(1)		
	0,8 мл/м ²	Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий	Вредители запасов	Опрыскивание. Расход - до 50 мл/м ² . Допуск людей и загрузка складов после проветривания в течение 1 суток	-(-)	-(1)	
	1,6 мл/м ²	Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах		Опрыскивание. Расход - до 200 мл/м ²			-(-)
	12-30 мл/т	Зерно продовольственное фуражное и семена бобовых культур		Опрыскивание. Расход - до 500 мл/т. Допуск людей после проветривания в течение 1 суток. Использование зерна на фуражные и продовольственные цели при содержании остатков препарата не выше МДУ			
	0,6 мл/м ²	Мука, крупа в мешках		Опрыскивание. Расход - до 50 мл/м ² . Допуск людей после проветривания в течение 1 суток	20(2)	10(4)	
	10 мл/10 л воды (Л)	Яблоня, груша, айва		Клещи, тли, долгоносики, плодоярки, листовертки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки			Опрыскивание в период вегетации. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)
		Вишня, черешня, слива	Тли, долгоносики, плодоярки, пилильщики, вишневая муха, шелкопряды, моли, листоеды, пяденицы, щитовки				
		Смородина	Тли, моли, галлицы, листовертки, пилильщики, щитовки, ложнощитовки	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 1-1,5 л на куст			
		Крыжовник	Пилильщики, листовертки, огневки, пяденицы				
			Малина	Малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, клещи, малинная почковая моль, тли	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. Расход - до 2 л на 10 кустов	-(2)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Земляника	Малинно-земляничный долгоносик, пилильщики, клещи	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 1,5 л/10 м ²	20(2)		
		Виноград	Клещи, мучнистый червец	Опрыскивание в период вегетации. Расход - от 2 до 5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)			
		Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль, мухи, тли, трипсы, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации			
		Огурцы и томаты открытого грунта	Клещи, ростковая муха, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 1 л/10 м ²			
		Огурцы и томаты защищенного грунта	Клещи, трипсы, тепличная белокрылка, пасленовая минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 2 л на 10 м ²	5(1)	2(-)	
		Дыня, арбуз	Дынная муха, клещи, тли, бахчевая коровка	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 1 л/10 м ²	20(2)	10(4)	
		Цитрусовые	Клещи, белокрылка, червцы, щитовки	Опрыскивание в период вегетации. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)			
		Цветочные культуры, декоративные кустарники	Комплекс вредителей	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 1,5 л/10 м ²			
(Р) Искра М, КЭ (525 г/л) ЗАО «ТПК Техноэкспорт» 3/1 0481-06-101-035-1-1-1-1 06.12.2008	0,5-1,2	Зерновые	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	20(1)	10(4)	
		Горох	Бобовая огневка, гороховая плодожорка	Опрыскивание при массовой яйцекладке			
			Гороховая зерновка, тли	Опрыскивание в период вегетации			
	0,4-0,8	Лен	Льняная плодожорка, совка-гамма, льняной трипс		-(1)		
	1-2,6	Малина	Малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, клещи, малинная почковая моль, тли	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. В питомниках и маточниках без ограничений	-(2)		
	0,6-1,2	Капуста	Белянки, совки, моли, тли, трипсы, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации	20(2)		
		Огурцы открытого грунта	Клещи, ростковая муха, тли, трипсы, белокрылка				
		Томаты открытого грунта	Клещи, тли, белокрылка				
	0,2-0,6	Люцерна, клевер, эспарцет (семенные посевы)	Клопы, тли, толстоножки, долгоносики, луговой мотылек, совки, огневки, галлицы		30(2)		
	2-2,6	Пастбища, участки заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок	20(2)		
	10 мл/5 л воды (Л)	Огурцы и томаты открытого грунта	Клещи, ростковая муха, тли, трипсы, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 5 л/100 м ²	20(2)		10(4)
	10 мл/10 л воды (Л)	Малина	Малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, клещи, малинная бочковая моль, тли	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - до 2 л/10 кустов	-(2)		
		Капуста	Белянка, совки, моли, тли, трипсы, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 10 л/100 м ²	20(2)		
		Яблоня, груша, айва	Клещи, тли, долгоносики, плодожорки, листовертки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - от 2 до 5 л/дерево (в зависимости от сорта и дерева)			
Вишня, черешня, слива		Тли, долгоносики, плодожорки, пилильщики, вишневая муха, листоеды, шелкопряды, пяденицы					
Смородина		Тли, моль почковая, листовая и побеговая, галлицы, листовертки, медяницы, пилиль-	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - от 1-1,5 л/куст				

1	2	3	4	5	6	7
			щитки, щитовки, ложнощитовки			
(Р) Фенаксин Плюс, Г (50 г/кг) ЗАО НПО «Гигиена Био», ФГУП «ВНИИХСЗР» 3/- 0486-06-101-153(051)-0-1-0-1 06.12.2016	100 г/10 м ² (Л)	Овощные, цветочные культуры, картофель, земляника	Медведка	Внесение в почву на глубину 2-5 см до высадки рассады в грунт или в период вегетации. Расход - 1 кг/100 м ²	20(2)	-(-)

Малатион + бифентрин

Простор, КЭ (400 + 20 г/л) ФМС Европа НВ 2/- 01-2024-0018-0 12.2013 * - до 16.02.2006	0,015 л/100 м ²	Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий с непоглащающей поверхностью	Вредители хлебных запасов	Опрыскивание перед загрузкой зерна с помощью ручных или моторизованных опрыскивателей или генераторов аэрозолей пестицидов. Расход - 5 л/100м ² . Допуск людей и загрузка складов после проветривания в течение 1 суток	-(1)	1(1)
		Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий с поглащающей поверхностью		Опрыскивание перед загрузкой зерна с помощью ручных или моторизованных опрыскивателей или генераторов аэрозолей пестицидов. Расход - 15 л/м ² . Допуск людей и загрузка складов через сутки после обработки		
	0,125 л/100 м ²	Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах		Опрыскивание с помощью ручных или моторизованных опрыскивателей. Расход - 15-30 л/100 м ²		
	0,015 л/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное и семена бобовых культур и *подсолнечника		Опрыскивание при перемещении зерна с использованием специальных распылителей инсектицидов. Расход - 0,1-1 л/т. Допуск людей и загрузка складов через сутки после обработки. Использование зерна на фуражные и продовольственные цели при содержании остатков препарата не выше рекомендованных МДУ		

Метилбромид (бромистый метил)

(Р) Метабром 980, ГАЗ (980 г/кг) Бромайн Компанис Лтд. 1/- 0905-07-101-268-1-1-0-0 18.10.2009	50 г/м ²	Теплично-парниковый грунт под огурцы, томаты, перцы, баклажаны, салат, укроп, сельдерей, петрушку	Комплекс почвенных вредителей	Фумигация в соответствии с «Инструкцией по обеззараживанию почвы бромистым метилом в теплицах» №01-19/138-11, утвержденной 28-29.10.1996 г. Допуск людей после проветривания в течение не менее 21 суток и при концентрации бромистого метила не выше 1/3 ПДК. Реализация продукции при содержании бромидов не выше МДУ	-(-)	21(21)
--	---------------------	---	-------------------------------	---	------	--------

Паратион-метил

(Р) Паращот, МКС (450 г/л) Кеминова А/С 3/1 0114-06-101-029-0-1-1-0 12.2015	0,5-0,6	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	10(4)
	0,75-1		Злаковая листовёртка	Обработка краевых полос шириной 50-100 м в фазе выхода в трубку	30(1)	
	0,5-1	Зерновые	Хлебная жужелица, хлебные жуки, злаковые мухи, зерновая совка, тли, пьявица, трипсы, луговой мотылек, хлебные клопы, саранчовые	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	
	0,25-0,5	Зернобобовые	Гороховая плодоярка, гороховая зерновка, клубеньковые долгоносики, бобовая огневка, тли, совки, клещи, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Запрещается обрабатывать зеленый горошек, спаржевую фасоль	40(2)	

1	2	3	4	5	6	7
	0,5	Люпин (семенные посевы)	Стеблевая минирующая муха, тли	Опрыскивание в начале цветения	-(1)	
	0,4-1	Участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период вегетации		
	0,25-0,5	Многолетние травы	Долгоносики, трипсы, толстоножки, огневки, луговой мотылек, клопы, тли, совки, галлицы	Опрыскивание до цветения		

Пиритабен

(Р) Санмайт, СП (200 г/кг) Ниссан Кемикал Индастриз, Лимитед 2/3 0366-06-102-118-0-1-3-0 12.2015	0,5-0,9	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	30(1)	30(30)
--	---------	--------	-------	---	-------	--------

Пиримифос-метил

(Р) Камикадзе, КЭ (500 г/л) ООО «Агрорус и Ко» «Агротрейд» Лтд. 3/1 1002-08-101- 170(172)-1-1-1-0 21.01.2010	1	Пшеница	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	30(1)	7(3)	
	1,2		Клоп вредная черепашка		30(2)		
	1,5-3	Чай	Чайная тля	Опрыскивание в период вегетации нелистосборных плантаций	-(2)		
	3		Чайная моль				Опрыскивание по окончании сбора листа
	1-1,5	Травы многолет- ние (семенные посевы)	Долгоносики, толстоножки, клопы, тли трипсы, огневки, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации			
(Р) Актеллик, КЭ (500 г/л) Сингента Лимитед 2/1 01-0070-0497-1 31.12.2013 * - до 16.02.2006	1	Пшеница	Трипсы, тли	Опрыскивание в период вегетации	25(1)	-(3)	
	1,2		Клоп вредная черепашка		20(2)		7(3)
	0,5	*Рис	Тли, комарики, имаго при- брежной мухи, щитень, эстерия			7(3)	
	2	*Свекла сахарная	Долгоносики				
	1,5		Мертвоеды				
	1		Блошки, листовая тля				
	1,5	*Картофель	Колорадский жук				
	3-5	Огурцы, томаты, *перцы, *баклажа- ны защищенного грунта	Тепличная белокрылка, ми- нирующая муха, клещи, тли, трипсы, комарик		3(2)		2(-)
	0,3-1,5	Огурцы, томаты, *перцы, *баклажа- ны открытого грунта	Тепличная белокрылка, клещи, тли, трипсы		20(2)		
	0,5	*Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль				
	1		Блошки, хреновый листоед				
		*Турнепс					
		*Сельдерей	Тли		30(1)		
		*Морковь	Морковная муха, листоблошки		30(2)		
	0,6	Земляника	Комплекс вредителей		20(2)		
		Малина	Огневки, пяденицы, пилиль- щики, листовертки, галлицы, тли, жуки				
	1,5	Смородина, кры- жовник					
	3	Виноград (маточ- ники подвойных сортов)	Листовая филлоксеры				
	2	*Персик	Щитовки, ложнощитовки		50(2)		
	0,6-0,8	Рябина черно- плодная	Вишневый слизистый пи- лильщик		30(2)		
			Облепиха		Облепиховая муха		30(1)

1	2	3	4	5	6	7
	1-1,5	Травы многолетние (семенные посевы)	Долгоносики, толстоножки, клопы, тли, трипсы, огневки, луговой мотылек		20(2)	-(3)
	1	*Люцерна фуражная	Долгоносики, клопы, совки			10(3)
	1,2-1,6	*Табак	Тли		20(4)	7(3)
	0,5-1,5	Городские зеленые насаждения	Комплекс вредителей		3(4)	2(-)
		Декоративные культуры открытого грунта			48(1)	7(3)
	2,4-3,6	Декоративные культуры защищенного грунта				
	0,3-0,6	Клюква крупноплодная	Совка-гамма			
	-	Смородина черная	Комплекс вредителей	Погружение зеленых черенков на 2 мин в 0,3%-й раствор.	-(1)	-(3)
	1,5-3	*Чай	Чайная тля	Опрыскивание в период вегетации нелистооборных плантаций	-(2)	7(3)
	3		Чайная моль	Опрыскивание по окончании сбора листа		
	0,5 мл/м ²	Шампиньоны (субстрат)	Грибные комарики и мухи	Опрыскивание субстрата	25(2)	2(-)
	0,6	Подорожник большой	Комплекс вредителей	Опрыскивание в период вегетации плантаций при уборке на лист	45(1)	7(3)
				Опрыскивание в период вегетации плантаций при уборке на сок	30(1)	
	0,6-0,8	Шиповник		Опрыскивание до и после цветения	40(2)	
	0,6	*Алтей лекарственный		Опрыскивание в период вегетации (уборка на корнях)	35(1)	
	0,8	*Расторопша пятнистая		Опрыскивание в фазе 2-х настоящих листьев	70(1)	
	0,6	Пустырник пятилопастный		Опрыскивание семенных плантаций	-(2)	
		Желтушник раскидистый		Опрыскивание всходов на плантациях 1-го года вегетации	-(1)	
	0,8	Копеечник альпийский	Клубеньковые долгоносики, блошки	Опрыскивание в фазе всходов плантаций 1-го года вегетации		
		Козлятник				
	1-1,5	Лиственные породы	Непарный шелкопряд, зеленая дубовая листовертка, зимняя пяденица и др. листогрызущие вредители	Опрыскивание. Разрешается выпас скота и сенокошение через 15 дней, сбор грибов - 4, ягод - 14 дней		-(3)
	0,3-0,5	Сосна	Сосновый шелкопряд			
	2	Саксаул	Бирюзовая листоблошка	Опрыскивание. Разрешается выпас скота и сенокошение через 15 дней	-(2)	
	0,4 мл/м ²	*Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих и пищевых предприятий	Вредители запасов	Опрыскивание. Расход - до 50 мл/м ² . Допуск людей и загрузка складов через 1 сутки после обработки	-(3)	1(1)
	0,8 мл/м ²	*Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах		Опрыскивание. Расход - 200 мл/м ²		-(3)
	16 мл/т	*Зерно продовольственное, семенное, фуражное		Опрыскивание. Расход - до 500 мл/т зерна		1(1)
	30 мл/10 л воды (Л)	*Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание при массовом появлении личинок. Расход - до 1 л/10 м ²	20(2)	7(3)
	40 мл/10 л воды (Л)	Огурцы, томаты, *перцы, *бакла-	Тепличная белокрылка, минирующая муха, клещи, тли,	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 2 л/10 м ²	3(2)	2(-)

1	2	3	4	5	6	7
		жаны защищенного грунта	трипсы, комарики			
	30 мл/10 л воды (Л)	Огурцы, томаты, *перцы, *бакла- жаны открытого грунта	Тепличная белокрылка, кле- щи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход - 1 л/10 м ²	20(2)	7(3)
		*Капуста	Комплекс вредителей		30(1)	
		*Сельдерей	Тли		30(2)	
		*Морковь	Морковная муха, листоб- лошки			
	15 мл/10 л воды (Л)	Земляника, мали- на, смородина, крыжовник	Комплекс вредителей	Опрыскивание в период вегетации. Расход - 1,5 л/10 м ²	20(2)	
		*Персик	Щитовки, ложнощитовки		50(2)	
	10 мл/10 л воды (Л)	Рябина черно- плодная	Вишневый слизистый пилильщик, зеленая тля, рябиновая плодожорка		30(2)	
	15 мл/10 л воды (Л)	Декоративные культуры откры- того грунта	Комплекс вредителей	Опрыскивание в период вегетации. Расход - 1 л/10 м ²	20(4)	2(-)
	20 мл/10 л воды (Л)	Декоративные культуры защи- щенного грунта		Опрыскивание в период вегетации. Расход - 2 л/10 м ²	3(4)	
		Смородина черная		Погружение зеленых черенков на 2 мин в 0,3%-й рабочий раствор	-(1)	
	15 мл/10 л воды (Л)	Ирга	Ирговая моль-пестрянка	Опрыскивание в период вегетации	25(2)	7(3)
		Боярышник	Плодовые пилильщики			
		Жимолость	Пилильщики			
ООО «Аксима» 01-3079-0735- 1(Ф) 12.2008 * до 16.02.2006	30 мл/10 л воды (Л)	*Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание при массовом появле- нии личинок. Расход - до 1 л/10 м ²	20(2)	7(3)
	40 мл/10 л воды (Л)	Огурцы, томаты, *перцы, *бакла- жаны защищенно- го грунта	Тепличная белокрылка, ми- нирующая муха, клещи, тли, трипсы, комарики	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 2 л/10 м ²	3(2)	2(-)
	30 мл/10 л воды (Л)	Огурцы, томаты, *перцы, *бакла- жаны открытого грунта	Тепличная белокрылка, кле- щи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход - 1 л/10 м ²	20(2)	7(3)
		*Капуста	Комплекс вредителей		30(1)	
		*Сельдерей	Тли		30(2)	
		*Морковь	Морковная муха, листоб- лошки			
	15 мл/10 л воды (Л)	Земляника, мали- на, смородина, крыжовник	Комплекс вредителей	Опрыскивание в период вегетации. Расход - 1,5 л/10 м ²	20(2)	
		*Персик	Щитовки, ложнощитовки		50(2)	
	10 мл/10 л воды (Л)	Рябина черно- плодная	Вишневый слизистый пилильщик, зеленая тля, рябиновая плодожорка		30(2)	
	15 мл/10 л воды (Л)	Декоративные культуры откры- того грунта	Комплекс вредителей	Опрыскивание в период вегетации. Расход - 1 л/10 м ²	20(4)	2(-)
	20 мл/10 л воды (Л)	Декоративные культуры защи- щенного грунта		Опрыскивание в период вегетации. Расход - 2 л/10 м ²	3(4)	
	30 мл/10 л воды (Л)	Смородина черная		Погружение зеленых черенков на 2 мин в 0,3%-й рабочий раствор	-(1)	
	15 мл/10 л воды (Л)	Ирга	Ирговая моль-пестрянка	Опрыскивание в период вегетации	25(2)	7(3)
		Боярышник	Плодовые пилильщики			
		Жимолость	Пилильщики			

Пирипроксифен

(Р) Адмирал, КЭ (100 г/л) Сумитомо Кемикал Агро Европа С.А.	0,5-0,8	Яблоня	Калифорнийская щитовка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000- 2000 л/га	14(1)	7(3)
	0,2-0,3	Огурец и томат закрытого грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-	3(1)	2(-)

1	2	3	4	5	6	7
3/3 0297-06-101-086-0-1-3-0 12.2015				3000 л/га		

Полипептид (сумма аминокислот)

Битиплекс, СП (200 г/кг) ООО «Биофарматек» 3/3 0163-06-101-041-0-0-3-0 12.2015	0,1-0,2	Капуста	Капустная совка (гусеницы 1-2 возраста), капустная и репная белянки, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)	-(-)
		Картофель	Колорадский жук (личинки 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га		
	0,15-0,2	Свекла сахарная	Луговой мотылек (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га		
		Подсолнечник				
	0,03-0,05 (А)	Лиственные и хвойные породы	Листо- и хвоегрызущие вредители (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1,5-50 л/га		

Пропаргит

(Р) Омайг, СП (300 г/кг) Кромптон Регистрейшнс Лимитед 2/3 0566-07-102-169-1-1-3-0 19.02.2009	2-3	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации	45(2)	7(3)
	1,6-2,4	Виноград			60(2)	
	3	Гвоздика ремонтантная, роза			3-5(1)	
	1,6-2,4	Вишня		Опрыскивание после сбора урожая	-(2)	
(Р) Омайг, ВЭ (570 г/л) Кромптон Регистрейшнс Лимитед 2/3 0639-07-102-169-1-1-3-0 19.03.2009	1,5-3	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации	45(2)	7(3)
	1,2-1,8	Виноград			60(2)	
	0,9-1,2	Вишня		Опрыскивание после сбора урожая	-(2)	

Сера

(Р) Климат, серная дымовая шашка (750 г/кг серы) ЗАО «ТПК Техно-экспорт» 2/- 0840-07-107-035-1-1-0-1 09.07.2009	300 г/20 м³ (Л)	Пустые парники, теплицы	Возбудители болезней, бактериальные инфекции, вредные насекомые, клещи	Фумигация сернистым ангидридом перед посадкой рассады. Дегазация - до 10 дней. Время экспозиции - 24-36 час.	-(1)	5(-)
	300 г/10 м³ (Л)	Пустые погреба		Фумигация сернистым ангидридом не позднее, чем за 5 дней до закладки продукции на хранение. По окончании фумигации - полное проветривание помещения в течение 48 часов до полного исчезновения специфического запаха сернистого ангидрида. Время экспозиции - 24-36 час.		
Тиовит Джет, ВДГ (800 г/кг) Сингента Кроп Протекшн АГ 3/4 01(02)-2120-0497-1 12.2011	3-4	Виноград	Клещи	Опрыскивание в период вегетации	1(1)	4(1)
	30-40 г/10 л воды (Л)	Виноград	Клещи	Опрыскивание в период вегетации. Расход - от 2 до 5 л на куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)	1(1)	4(1)
(Р) ФАС, серная шашка (800 г/кг) ЗАО НПО «Гигиена-Био», ФГУП «ВНИИХСЗР» 3/- 0513-07-101(107)-048(051)-1-1-0-1 10.01.2009	60 г/м³ (Л)	Пустые парники, теплицы	Вредные насекомые и клещи, возбудители болезней, бактериальные инфекции	Фумигация пустых помещений перед посадкой растений. Допуск людей после полного проветривания	-(1)	6(-)
	30-60 г/м³ (Л)	Пустые погреба		Фумигация. Экспозиция - 24-36 часов. Допуск людей после полного проветривания в течение 48 часов полного исчезновения специфического запаха сернистого ангидрида		

Инсектициды

1	2	3	4	5	6	7	
Тау-флювалинат							
(Р) Маврик, ВЭ (240 г/л) Мактешим-Аган Индастриз Лтд. 3/2 0800-07-101-232-1-1-2-0 28.05.2009	0,8	Яблоня	Яблонная плодояорка	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	7(3)	
	0,6		Клещи				
	0,24-0,36	Виноград					
Тефлутрин							
(Р) Форс, МКС (200 г/л) ООО «Сингента» 2/- 0998-08-101-018-1-1-0-0 21.01.2010	16,5-28,8	Свекла сахарная	Проволочники	Обработка семян. Расход рабочей жид-кости - до 10 л/т	-(1)	-(-)	
	3-5	Кукуруза					
	2-5	Подсолнечник					
Тиаклоприд							
(Р) Калипсо, КС (480 г/л) Байер КронСайенс АГ 2/3 1064-08-101-010-0-1-3-0 21.02.2018	0,3-0,45	Яблоня	Яблонная плодояорка, лис-товертки, щитовки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	28(2)	-(3)	
	0,18-0,3		Яблонный цветоед	Опрыскивание в период обособления бутонов. Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	28(1)		
Тиаметоксам							
Доктор, ТБ (10 г/кг) ООО «Фирма «Зеленая Аптека Садовода» 3/- 1054-08-101-030-0-1-0-1 21.02.2018	2-5 брике-тов/ горшок (Л)	Комнатные цве-точные растения	Тли, щитовки, белокрылка, червецы, трипсы	Внесение брикетов под растения с неодревесневшими стеблями высотой до 30-40 см на расстоянии 2-3 см от стебля в предварительно политую водой почву	-(1)	-(-)	
	2-3 брикета/ растение (Л)	Балконные цве-точные растения					
Актара, ВДГ (250 г/кг) Сингента Крон Протекшн АГ 3/1 01-2053-0497-1 31.12.2013 * - до 16.02.2006	0,06-0,08	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица	Опрыскивание в период вегетации	30(1)	7(3)	
	0,1-0,15		Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов	-(1)		
	0,07	Ячмень	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации	30(1)		
	0,06	Картофель	Колорадский жук		14(1)		
	0,3-0,6		Колорадский жук, проволоч-ники	Опрыскивание дна борозды во время посадки	-(1)	-(3)	
	0,3		Колорадский жук	Внесение в борозды при посадке с помощью аппликатора			
	0,4-0,6		Проволочники				
	0,1	Горох, зеленый горошек	Гороховая плодояорка, горо-ховая зерновка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации	15(1)	7(3)	
	0,2-0,3	*Яблоня	Яблонная медяница	Опрыскивание до цветения	60(1)		
	0,1-0,125		Яблонный цветоед				
	0,3-0,4	*Груша	Грушевая медяница	Опрыскивание в период вегетации	60(2)		
	0,8	Томаты защи-щенного грунта	Тли, белокрылка	Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений более 1 м	3(1)	3(-)	
	0,4			Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений менее 1м			
	0,8	Огурцы защи-щенного грунта	Тли, табачный трипс, белокрылка	Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений более 1 м			
	0,4			Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений менее 1 м			
	0,1-0,6		Тли	Опрыскивание в период вегетации 0,01-0,02%-м рабочим раствором			
	0,8	Баклажаны защи-щенного грунта	Тли, табачный трипс, розанный трипс	Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений более 1 м			
	0,4			Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений менее 1 м			
	0,8	Перцы защищен-ного грунта	Тли, табачный трипс	Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений более 1 м			

1	2	3	4	5	6	7
	0,4			Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений менее 1 м		
	0,15-0,2	Смородина	Тли	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая	-(2)	-(3)
	0,3	Капуста	Мухи, блошки	Полив рассады в кассетах за 1-2 дня до высадки рассады в поле. Не допускается переувлажнения (на 30-50 тысяч штук рассады)	60(1)	
	0,1-0,4	Розы открытого грунта	Тли	Опрыскивание растений по очагам или проведение сплошных обработок при появлении на них вредителей 0,02%-м рабочим раствором	14(1)	7(3)
	1,6		Трипсы	Опрыскивание растений по очагам или проведение сплошных обработок при появлении на них вредителей 0,08%-м рабочим раствором		
	0,1-0,4	Розы защищенно-го грунта	Тли	Опрыскивание растений по очагам или проведение сплошных обработок при появлении на них вредителей 0,02%-м рабочим раствором	3(3)	-(-)
	1,6		Трипсы	Опрыскивание растений по очагам или проведение сплошных обработок при появлении на них вредителей 0,08%-м рабочим раствором		
	0,1-0,4	Горшечные цветочные растения	Тли	Опрыскивание растений по очагам или проведение сплошных обработок при появлении на них вредителей 0,02%-м рабочим раствором		
	0,5		Тепличная белокрылка, щитовки и ложнощитовки	Опрыскивание растений по очагам или проведение сплошных обработок при появлении на них вредителей 0,05%-м рабочим раствором		
	0,9	Цветочные культуры открытого и защищенного грунта, цветочная рассада	Тли, белокрылки, трипсы, щитовки и ложнощитовки	Полив почвы под растения высотой 30-40 см	20(1)	
			Почвенные мушки, грибные комарики	Полив почвы под растениями		
	1,2 г/10 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	14(1)	7(3)
	1 г/10 л воды (Л)	Горшечные цветочные растения	Почвенные мушки, грибные комарики Тли, белокрылки, трипсы, щитовки и ложнощитовки	Полив почвы под растениями	-(-)	-(-)
	8 г/10 л воды (Л)			Многokратный полив почвы под растениями высотой 30-40 см. Расход - до 10 л/10 м ² (250 горшков)		
				Опрыскивание растений при появлении на них вредителей. Расход - до 2 л/100 м ²		
		Цветочные и декоративные растения		Опрыскивание растений при появлении на них вредителей. Расход рабочей жидкости - до 1 л/10 м ²		
	2 г/10 л воды (Л)	Смородина	Тли	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая	-(2)	7(-)
(Р) Круйзер, КС (350 г/л) ООО «Сингента» 3/- 0155-06-101-018-0-1-0-0 12.2015	8-12	Свекла сахарная	Комплекс вредителей всходов	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) для фракции 4,5-5,5 мм	-(1)	-(-)
	10-14			Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) для фракции 3,5-4,5 мм и для дражированных		
	8-10	Рапс, горчица	Крестоцветные блошки	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года)		
		Подсолнечник	Проволочники			
	0,5	Пшеница	Хлебная жужелица			
Феназахин						
(Р) Демитан, СК (200 г/л) Гован Комерцио Интернациональ и Сервиос	0,3-0,45	Яблоня, груша	Клещи	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	10(4)
	0,24-0,36	Виноград			45(1)	

1	2	3	4	5	6	7
Лимитада 2/3 0534-07-101-164- 1-1-3-0 23.01.2009						

Фенитротин

(Р) Сумитион, КЭ (500 г/л) Сумитомо Кемикал Агро Юроп С.А.С. 3/1 0604-07-101-186- 1-1-1-0 01.03.2009	0,6-1	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	-(3)
	0,8-1		Трипсы, тли, хлебные жуки			
	1		Злаковая листовертка	Обработка краевых полос шириной 50-100 м в фазе выхода в трубку	30(1)	
	0,5	Ячмень	Тли			
	1	Рис		Комарики, имаго прибрежной мухи		
	0,7					
	3	Яблоня, груша	Плодожорки	30(2)		
	1,6-2,5		Моли, тли, стеклянница, щитовки, ложнощитовки			
	1-1,5	Конопля (для технических целей)	Блошки, листовертка конопляная			
	0,8-1,8	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок	20(1)	

Феноксикарб

(Р) Инсегар, ВДГ (250 г/кг) ООО «Сингента» 3/4 0446-06-101-018- 1-1-4-0 04.10.2008	0,6	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации	30(3)	7(3)
		Виноград	Гроздевая листовёртка	Опрыскивание в период вегетации против 2-го поколения вредителя	20(1)	
	0,4	Слива	Сливовая плодожорка	Опрыскивание в период вегетации	30(3)	
(Р) Фазис, СП (250 г/кг) ООО «Агропром-химснаб» 3/3 0442-06-101-121- 1-1-3-0 04.10.2008	0,6	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	30(3)	7(3)
		Виноград	Гроздевая листовёртка	Опрыскивание в период вегетации против 2-го поколения вредителя. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	30(1)	

Фипронил

(Р) Регент, ВДГ (800 г/кг) БАСФ Агро Б.В. 2/1 1069-08-101-007- 0-1-1-0 21.02.2018	0,03	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание в период появления всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)
			Клоп вредная черепашка (личинки младших возрастов)	Опрыскивание в фазе молочной спелости при численности не более 1 экз/м ² . Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	
	0,0225		Пьявица	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	
	0,02	Ячмень				
	0,02-0,025	Картофель	Колорадский жук			
Регент, ВДГ (800 г/кг) БАСФ Агро Б.В. 2/1 0961-07-101-004- 1-0-1-0 20.03.2008	0,02-0,025	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	7(3)
	0,03	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание в период появления всходов	30(1)	
			Клоп вредная черепашка (личинки младших возрастов)	Опрыскивание в фазе молочной спелости, при численности не более 1 экз./м ²	30(1)	
	0,0225		Пьявица	Опрыскивание в период вегетации		
	0,02	Ячмень				
Адонис, КЭ (40 г/л) БАСФ Агро Б.В. 3/3 0085-06-101-004- 0-0-3-0 12.2015	0,1	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок	21(1)	-(-)
	0,1 (А)			Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости - 50 л/га		

1	2	3	4	5	6	7
Регент, КЭ (25 г/л) БАСФ Агро Б.В. 3/2 01-0792-0250-1 12.2008	0,6	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	7(3)
	5-6 мл/10 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход - 10 л/100 м ²	30(2)	7(3)

Хлорпирифос

(Р) Хлорпирифос, КЭ (480 г/л) ООО АНПП «Агрохим XXI» 3/1 1048-08-101-162-1- 1-1-0 10.02.2010	2	Яблоня	Плодожорки, листовертки, моли, щитовки, тли, клещи	Опрыскивание в период вегетации	40(2)	-(4)
(Р) Дурсбан, КЭ (480 г/л) Дау АгроСаенсес ВмбХ 3/1 0807-07-101-166-1- 1-1-0 03.06.2009	2-2,5	Свекла сахарная	Обыкновенный свеклович- ный долгоносик, совки, крошка, щитоноски	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	13(4)
	1,5		Блошки		-(1)	
	0,8		Листовая тля			
	1,5-2		Луговой мотылек, мертвоеды			
	2	Яблоня	Плодожорки, листовертки, моли, клещи, щитовки, тли		40(2)	
	1,5	Картофель	Колорадский жук			
(Р) Фосбан, КЭ (480 г/л) ООО «Агрорус и Ко», Агротрейд Лтд 2/1 0760-07-101-170 (172)-1-1-1-0 09.05.2009	2	Яблоня	Плодожорки, листовертки, моли, щитовки, тли, клещи	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	40(2)	7(3)
(Р) Пиринекс, КЭ (480 г/л) Мактешим-Аган Индастриз Лтд. 3/1 0799-07-101-232- 1-1-1-0 22.05.2009	2-2,5	Свекла сахарная	Обыкновенный свеклович- ный долгоносик, совки, крошка, щитоноски	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	13(4)
	1,5		Блошки		1(-)	
	0,8		Листовая тля		30(2)	
	1,5-2		Луговой мотылек, мертвоеды			
	2	Яблоня	Плодожорки, листовертки, моли, клещи, щитовки, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	40(2)	
	1,5	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га		

Хлорпирифос + циперметрин

(Р) Ципи Плюс, КЭ (480 + 50 г/л) ООО «Агрорус и Ко», Агротрейд Лтд. 2/1 0606-07-101-170 (172)-0-1-1-0 12.03.2017	1,5	Яблоня	Плодожорки, листовертки, тли, клещи, моли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	10(4)
	0,5	Пастбища, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинки. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	

Циперметрин

(Р) Вега, КЭ (250 г/л) ООО «Лазорик-Дон» 3/1 1044-08-101-272- 1-1-1-0 10.02.2010	0,2	Пшеница	Злаковая тля, хлебный клопик, пьявица, блошки, хлебные трипсы, клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	20(2)	-(3)
	0,48	Свекла сахарная (семенные участки)	Тли-переносчики вирусных заболеваний		-(4)	
		Картофель (семенные посадки)				
	0,16	Картофель	Картофельная моль		20(2)	

1	2	3	4	5	6	7		
	0,1-0,16		Колорадский жук, карто- фельная коровка					
	0,5	Морковь	Морковная муха, морковная листоблошка					
	0,14-0,24	Крестоцветные культуры (семен- ные посевы)	Рапсовый цветоед		-(3)			
	0,24	Люцерна	Фитономус		20(2)			
(Р) Шарпей, МЭ (250 г/л) ЗАО Фирма «Август» 3/1 0995-08-101-003- 1-1-1-0 21.01.2010	0,32	Кукуруза (на зер- но)	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)		
	0,15		Кукурузный мотылёк					
	0,2	Пшеница	Злаковая тля, хлебный кло- пик, пьявица, блошки, хлеб- ные трипсы, клоп вредная черепашка, хлебные жуки				Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(1)
			0,15-0,2					
	0,3		Хлебная жужелица	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)			
	0,2-0,25		Ячмень	Внутристеблевые мухи				
	0,1-0,2	Пьявица						
	0,2	Хлебные блошки						
	0,2	Лен-долгунец	Льняные блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)			
		Подсолнечник (на семена и масло)	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)			
	0,2-0,3		Соя				Бобовая огневка	
	0,3		Луговой мотылек, соевая плодожорка, многоядный листоед				20(2)	
	0,1-0,2	Горох, зеленый горошек	Гороховая тля					
	0,2-0,3		Гороховая плодожорка					
	0,3		Гороховая зерновка					
	0,48	Свекла сахарная и кормовая (семен- ные участки)	Тли-переносчики вирусных заболеваний		-(4)			
		Картофель (се- менные посадки)						
	0,16	Картофель	Картофельная моль			20(2)		
	0,1-0,16		Колорадский жук, карто- фельная коровка					
	0,24	Люцерна	Фитономус, луговой мотылек	-(2)				
	0,14-0,24	Крестоцветные культуры (семен- ные посевы)	Рапсовый цветоед	-(3)				
	0,2	Свекла сахарная, свекла кормовая	Свекловичные блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабо- чей жидкости - 100-200 л/га	-(1)			
			Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га		20(2)		
	0,4		Подгрызающие совки					
	0,16	Капуста	Белянки, совки, моли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	25(3)			
	0,16-0,32	Яблоня	Плодожорки, листовертки					
	0,26-0,38	Виноград	Листовертки					
	0,24-0,32	Арбуз, дыня, то- мат	Совки подгрызающие	Опрыскивание в весенний период. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)			
	0,06	Дыня	Бахчевая коровка	Опрыскивание в период вегетации.	30(2)			
	0,5	Морковь	Морковная муха, морковная листоблошка	Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)			
	0,1-0,15	Пастбища, луга, посевы многолет- них трав	Саранчовые	Опрыскивание в период развития ли- чинок младшего возрастов. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)			

1	2	3	4	5	6	7
	0,2	Пустырьник сердечный (семенные плантации)	Цикадки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га		
(Р) Арриво, КЭ (250 г/л) ФМС Европа НВ 2/1 01-0010-0018-1 12.2014	0,32	Кукуруза	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации	20(2)	-(3)
	0,15		Кукурузный мотылек			
	0,2	Пшеница	Злаковая тля, хлебный клопик, пьявица, блошки, трипсы, клоп вредная черепашка			
	0,4	Свекла сахарная	Подгрызающие совки		-(4)	7(3)
	0,15-0,2		Луговой мотылек		20(1)	
	0,48	Свекла сахарная (семенные посевы)	Тли-переносчики вирусных заболеваний		-(4)	
		Картофель (семенные посевы)				
	0,16	Картофель	Картофельная моль		20(2)	
	0,1-0,16		Колорадский жук, картофельная коровка			
	0,32	Соя	Луговой мотылек, соевая плодожорка, многоядный листоед			-(3)
	0,24	Люцерна	Фитонмус			
	0,14-0,24	Крестоцветные культуры (семенные посевы)	Рапсовый цветоед		-(3)	
	0,15-0,2	Рапс, горчица	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки, клопы, белянки, тли			
	0,16	Капуста	Белянки, совки, моли		25(3)	7(3)
	1,2-1,6	Огурцы, томаты, перцы защищенного грунта	Белокрылка		3(2)	2(-)
	0,64-0,8		Тли, трипсы			
	0,16-0,32	Яблоня	Плодожорки, листовертки		25(3)	7(3)
	0,26-0,38	Виноград	Листовертки			
	0,24-0,32	Арбуз, дыня, томаты	Совки подгрызающие	Опрыскивание в весенний период	20(1)	
	0,06	Дыня	Бахчевая коровка	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	
	0,5	Морковь	Морковная муха, листоблошки		20(2)	
	0,5 мл/м ²	Шампиньоны	Грибные мухи и комарики	Опрыскивание субстрата	25(2)	
	0,3	Мачек желтый	Листоед шовный, тли	Опрыскивание в период вегетации		
	0,2	Пустырьник пятилопастный (семенные посевы)	Цикадки		-(1)	
		Шиповник	Комплекс вредителей	Опрыскивание в фазе бутонизации	90(1)	
	0,02	Лиственные и хвойные породы	Хвое- и листогрызущие вредители (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание. Разрешается выпас лактующего скота через 5 дней, откормочного и молодняка - 3, сбор грибов и ягод - 10, отдых - 4 дня. Сенокосение без ограничений	-(1)	-(3)
	0,01	Дуб	Непарный шелкопряд, листовертки, пяденицы			
	0,024	Ель	Обыкновенный еловый пилильщик			
	0,08	Сосна	Почковый побеговьюн, шишковая смолевка			
	0,02		Сосновая совка			
	0,016		Рыжий сосновый пилильщик			
	0,04		Сосновый шелкопряд			
	0,04-0,1		Большой сосновый долгоносик	Предпосадочное опрыскивание саженцев		
	2-4 мл/м ²	Хвойные породы	Стволовые и технические вредители	Опрыскивание заготовленной древесины в штабелях. Доза на 1 м ² поверхности штабеля		
	3 мл/м ²	Лиственные и хвойные породы	Стволовые вредители	Инъекция под кору. Доза на 1 м ² поверхности коры дерева		
	0,05-0,1	Городские зеленые насаждения	Тополевая моль, непарный шелкопряд	Опрыскивание растений в период вегетации 0,01%-м рабочим раствором	7(1)	

1	2	3	4	5	6	7	
	0,1-0,15	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок	20(1)	-(3)	
	0,8 мл/м²	Незагруженные складские помещения, оборудование зерноперерабатывающих предприятий	Вредители запасов (кроме клещей)	Опрыскивание. Расход - до 200 мл/м². Допуск людей и загрузка складов через 1 сутки после обработки	-(1)	1(1)	
	1,6 мл /м²	Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах		Опрыскивание. Расход - до 200 мл/м²			
	24 мл /т	Зерно злаковых и семена бобовых		Опрыскивание. Расход - до 500 мл/т зерна. Запрещается использование зерна на продовольственные и фуражные цели			
	1,5 мл/10 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук, картофельная коровка	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 10 л/100 м²	20(2)	7(3)	
(Р) Ципи, КЭ (250 г/л) Агротрейд Лтд., ООО «Агрорус и Ко» 2/1 01-129-0131 (0132)-1 12.2010 (Р) Ципер, КЭ (250 г/л) Панама Агрокемикалс Инк. 2/1 01-2584-0196-1 12.2010 * - до 09.02.2006	0,32	*Кукуруза	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации	20(2)	-(3)	
	0,15		Кукурузный мотылек				
	0,2	Пшеница	Злаковая тля, хлебный клопик, пьявица, блошки, хлебные трипсы, клоп вредная черепашка		-(4)	7(3)	
	0,4		Подгрызающие совки				
	0,48	Свекла сахарная (семенные посевы)	Тли-переносчики вирусных заболеваний		20(2)		
		Картофель (семенные посевы)					
	0,16	Картофель	Картофельная моль		-(3)		
	0,1-0,16		Колорадский жук, картофельная коровка				
	0,32	*Соя	Луговой мотылек, соевая плодоярка, многоядный листоед				
	0,24	Люцерна	Фитонемус				
	0,14-0,24	Крестоцветные культуры (семенные посевы)	Рапсовый цветоед		-(3)		
	0,16	Капуста	Белянки, совки, моли		25(3)	7(3)	
	1,2-1,6	*Огурцы, томаты, перцы защищенного грунта	Белокрылка		3(2)	2(-)	
	0,64-0,8	Яблоня	Тли, трипсы		25(3)	7(3)	
	0,16-0,32		Плодожорки, листовертки				
	0,26-0,38	*Виноград	Листовертки	Опрыскивание в весенний период	20(1)		
	0,24-0,32	Арбуз, дыня, томаты	Совки подгрызающие				
	0,06	Дыня	Бахчевая коровка	Опрыскивание в период вегетации	30(2)		
	0,5	*Морковь	Морковная муха, листоблошки		20(2)		
	0,5 мл/м²	Шампиньоны	Грибные мухи и комарики	Опрыскивание субстрата	25(2)		
	0,3	Мачек желтый	Листоед шовный, тли	Опрыскивание в период вегетации	-(1)		
	0,2	Пустырник пятилопастный (семенные посевы)	Цикадки	Опрыскивание в фазе бутонизации	90(1)	-(-)	
			Шиповник				Комплекс вредителей
	0,02	Лиственные и хвойные породы	Хвое- и листогрызущие вредители (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание. Разрешается выпас лактирующего скота через 5 дней, откормочного и молодняка - 3, сбор грибов и ягод - 10, отдых - 4 дня. Сенокосение без ограничений	-(1)		
	0,01	Дуб	Непарный шелкопряд, листовертки, пяденицы				
	0,024	Ель	Обыкновенный еловый пильщик				

1	2	3	4	5	6	7
	0,08	Сосна	Почковый побеговыюл, шишковая смолевка	Предпосадочное опрыскивание саженцев		
	0,02		Сосновая совка			
	0,016		Рыжий сосновый пилильщик			
	0,04		Сосновый шелкопряд			
	0,04-0,1		Большой сосновый долгоносик			
	2-4 мл/м ²	Хвойные породы	Стволовые и технические вредители	Опрыскивание заготовленной древесины в штабелях. Доза на 1 м ² поверхности штабеля	7(1)	7(3)
	3 мл/м ²	Лиственные и хвойные породы	Стволовые вредители	Инъекция под кору. Доза на 1 м ² поверхности коры дерева		
	0,05-0,1	Городские зеленые насаждения	Тополевая моль, непарный шелкопряд	Опрыскивание растений в период вегетации 0,01%-м рабочим раствором		
	0,1-0,15	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20(1)	
(Р) Инта-Вир, ВРП (37,5 г/кг) ЗАО НПП «Виртан», ОАО «Виртан-Промэкс» 3/2 01-0861-0085-1 30.12.2012	2,2	Кукуруза	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации	20(2)	-(3)
	1,4	Пшеница	Злаковая тля, хлебный клопик, пшавица, блошки, хлебные трипсы, клоп вредная черепашка			
	2,6	Свекла сахарная	Подгрызающие совки		-(4)	7(3)
	1	Картофель	Картофельная моль		20(2)	
	0,6-1		Колорадский жук, картофельная коровка			-(3)
	2,2	Соя	Луговой мотылек, соевая плодожорка, многоядный листоед			7(3)
	1,6	Люцерна	Фитонмус			
	1-1,6	Крестоцветные культуры (семенные посевы)	Рапсовый цветоед		-(3)	
	1	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль		25(3)	
	4,2-5,4	Огурцы, томаты, перцы защищенного грунта	Тли, трипсы		3(2)	3(-)
	8-10	Огурцы, томаты защищенного грунта	Белокрылка			
	1-2	Вишня, черешня	Вишневая муха		20(1)	7(3)
		Яблоня	Плодожорки, листовертки		25(3)	
	1,8-2,6	Виноград	Листовертки			
	1,6-2,2	Арбуз, дыня, томаты	Совки подгрызающие	Опрыскивание в весенний период	20(1)	
	0,4	Дыня	Бахчевая коровка	Опрыскивание в период вегетации	30(2)	
	3,4	Морковь	Морковная муха, листоблошки		20(2)	
	3 г/м ²	Шампиньоны	Грибные мухи и комарики	Опрыскивание субстрата	25(2)	2(-)
	0,8-1,2	Земляника	Долгоносик	Опрыскивание до цветения	20(1)	
	0,6	Копеечник альпийский	Серый и клубеньковые долгоносики	Опрыскивание в фазе всходов или 1-2 настоящих листьев		
		Пустырник пятилопастный (семенные посевы)	Комплекс вредителей	Опрыскивание в период вегетации до начала цветения	-(1)	-(3)
		Ревень тангутский	Блошки	Опрыскивание в фазе всходов	20(1)	7(3)
	0,8	Шиповник	Комплекс вредителей	Опрыскивание в фазе бутонизации		
	0,06-1,5	Цветочные культуры защищенного грунта	Тли, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации	3(2)	2(-)
	0,06-1	Цветочные культуры открытого грунта	Тли, трипсы, огородная совка		7(2)	7(3)

1	2	3	4	5	6	7	
	1	Городские зеленые насаждения	Тли, листогрызущие гусеницы	Опрыскивание в период вегетации 0,03%-м рабочим раствором		-(-)	
	0,8-1	Сосна	Рыжий сосновый пилильщик	Опрыскивание. Разрешается выпас лактирующего скота через 5 дней, откормочного и молодняка - 3, сбор грибов и ягод - 10, отдых - 4 дня. Сенокосение без ограничений	-(1)		
	1-1,2		Сосновый шелкопряд				
	1,5	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок, младших возрастов	20(1)	7(3)	
	2			Опрыскивание по личинкам средних и старших возрастов			
	16 г/10 л воды (Л)	Огурцы, томаты защищенного грунта	Белокрылка	Опрыскивание растений в период вегетации. Расход - до 2 л/10 м ²	3(1)	3(-)	
	8 г/10 л воды (Л)		Тли, трипсы				
		Свекла сахарная	Подгрызающие совки	Опрыскивание растений в период вегетации. Расход - до 10 л/100 м ²	20(2)	7(3)	
		Картофель	Картофельная моль				
			Колорадский жук, картофельная коровка		25(3)		
		Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль				
		Яблоня, груша, айва	Плодожорки, листовертки	Опрыскивание растений в период вегетации. Расход - до 2 л на молодое дерево, до 5 л на взрослое	20(1)		
		Вишня, черешня	Вишневая муха				
	16 г/10 л воды (Л)	Виноград	Листовертки	Опрыскивание растений в период вегетации. Расход - от 2 до 5 л на куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)		30(2) 20(2)	
	8 г/10 л воды (Л)	Дыня	Бахчевая коровка	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 10 л/100 м ²			
		Морковь	Морковная муха, листоблошки				
	12 г/10 л воды (Л)	Земляника	Долгоносик	Опрыскивание до цветения. Расход - до 1,5 л/10 м ²	20(1)	3(-)	
8 г/10 л воды (Л)	Шиповник	Комплекс вредителей	Опрыскивание в фазе бутонизации				
	Цветочные культуры	Тли, трипсы, листогрызущие гусеницы	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 2 л/10 м ²	3(3)			
	Пустырник пятилопастный (семенные плантации)	Комплекс вредителей	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 3 л/100 м ² .	(1)			
	Ревень тангутский	Блошки	Опрыскивание в фазе всходов. Расход - до 2 л/100 м ²				
(Р) Инта-Вир, ТАБ (37,5 г/кг) ЗАО НПП «Виртан» 3/2 01-0777-0085-1 30.12.2012	2 таб/10 л воды	Огурцы, томаты защищенного грунта	Белокрылка	Опрыскивание растений в период вегетации	3(1)	3(-)	
	1 таб/10 л воды		Тли, трипсы		20(2)	7(3)	
		Свекла сахарная	Подгрызающие совки				
		Картофель	Картофельная моль		25(3)		
			Колорадский жук, картофельная коровка				
		Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль		(1)		
		Яблоня, груша, айва	Плодожорки, листовертки				
		Пустырник пятилопастный (семенные плантации)	Комплекс вредителей			3(-)	
		Ревень тангутский	Блошки	Опрыскивание в фазе всходов			
		Шиповник	Комплекс вредителей	Опрыскивание в фазе бутонизации	20(1)		
		Цветочные культуры	Тли, трипсы, листогрызущие гусеницы	Опрыскивание в период вегетации	3(3)		
		Дыня	Бахчевая коровка		30(2)		
	Морковь	Морковная муха, листоблошки		20(2)			

1	2	3	4	5	6	7
	2 таб/10 л воды	Виноград	Листовертки		2(3)	
	1,5 таб/10 л воды	Земляника	Долгоносик	Опрыскивание до цветения	20(1)	
	1 таб/10 л воды (Л)	Вишня, черешня	Вишневая муха	Опрыскивание растений в период вегетации. Расход - до 2 л на молодое дерево, до 5 л на взрослое	20(1)	3(-)

Циперметрин + креолин

(Р) Креоцид Про, КЭ (25 г/л) ЧП Зленко Е.В. 3/1 01-779-0004-1 12.2011	0,04-0,06 (А)	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	3(1)	7(3)
	0,03	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль		20(1)	
	0,3 (А)	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок		
	0,075-0,1	Горох, зеленый горошек	Гороховая зерновка, гороховая плодоярка	Опрыскивание в период вегетации		
	0,045-0,06 (А)	Сосна	Рыжий сосновый пилильщик	Опрыскивание. Разрешается выпас лакирующего скота через 5 дней, откормочного и молодняка - 3, сбор грибов и ягод - 10, отдых - 4 дня. Сенокосшение без ограничений	-(1)	-(-)
	0,06-0,08 (А)		Сосновый шелкопряд			
	0,075-0,1	Пустырник сердечный (семенные посевы)	Цикадки	Опрыскивание в период вегетации до цветения		7(3)
	0,075	Ревень тангутский 1-го года вегетации	Блошки	Опрыскивание в фазе всходов культуры		
	0,05-0,075	Душица лекарственная (семенные посевы)	Цикадки	Опрыскивание в период вегетации до цветения		
	4 мл/10 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 10 л/100 м ²	20(2)	7(3)
		Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 10 л/100 м ²	20(1)	

Циперметрин + малатион

(Р) Инта-Ц-М, ТАБ (29 + 140 г/кг) ЗАО «Промэкс» 3/1 0337-06-101-103-1-1-1-1 12.2015	2 таб/10 л воды (Л)	Огурцы, томаты защищенного грунта	Белокрылка	Опрыскивание растений в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 2 л/10 м ²	5(1)	3-10(-)
	1 таб/10 л воды (Л)	Картофель	Тли, трипсы Картофельная моль, колорадский жук, картофельная коровка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 5 л/100 м ²	20(2)	

Циперметрин + перметрин

(Р) Искра, СП, ТАБ (21 + 9 г/кг) ЗАО «ТПК Техноэкспорт» 3/1 0981-08-101-035-1-1-1-1 11.07.2008	10 г/10 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук, картофельная моль, картофельная коровка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м ²	20(2)	10(-)
		Сахарная свекла	Подгрызающие совки			
		Яблоня	Тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево	20(1)	
		Огурцы и томаты открытого грунта		Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 10-20 л/100 м ²		
		Земляника	Малинно-земляничный долгоносик, крапивно-лиственной долгоносик, земляничный листоед, земляничная листовертка, земляничный пилильщик, шелковистый пилильщик	Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости - до 1,5 л/10 м ²		
		Перцы, баклажаны	Колорадский жук, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 2 л/10 м ²		

1	2	3	4	5	6	7
		Смородина	Тли, моли, листовертки, пилильщики	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - до 1,5 л/10 м ²	20(2)	
		Крыжовник	Пилильщики, листовертки, огневки, пяденицы			
		Малина	Малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, малинная почковая моль, тли			
		Кукуруза	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 10 л/100 м ²		
		Цветочные культуры, декоративные кустарники	Комплекс вредителей	Опрыскивание до и после цветения. Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 2 л/10 м ²		
	1 таб /10 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук, картофельная моль, картофельная коровка	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 10 л/100 м ²	20(2)	10(-)
		Сахарная свекла	Подгрызающие совки			
		Яблоня	Тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дереву	20(1)	
		Огурцы и томаты открытого грунта		Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 10-20 л/100 м ²		
		Земляника	Малинно-земляничный долгоносик, крапивно-листовой долгоносик, земляничный листоед, земляничная листовертка, земляничный пилильщик, шелковистый пилильщик	Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости - до 1,5 л/10 м ²		
		Перцы, баклажаны	Колорадский жук, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 2 л/10 м ²	20(2)	
		Смородина	Тли, моли, листовертки, пилильщики	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - до 1,5 л/10 м ²		
		Крыжовник	Пилильщики, листовертки, огневки, пяденицы			
		Малина	Малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, малинная почковая моль, тли			
		Кукуруза	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 10 л/100 м ²		
		Цветочные культуры, декоративные кустарники	Комплекс вредителей	Опрыскивание до и после цветения. Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 2 л/10 м ²		

Эсфенвалерат

(Р) Сэмпей, КЭ (50 г/л) ЗАО Фирма «Август» 3/1 0975-07-101-003- 1-1-1-1 25.12.2009	0,2-0,25	Пшеница	Злаковые галлицы	Опрыскивание в период цветения	15(2)	7(4)
			Клоп вредная черепашка, пьявица	Опрыскивание в период вегетации		
			Мухи внутриветрбелые			
			Тли			
	0,3	Ячмень	Пьявица, мухи, блошки		15(1)	
	0,1-0,2				20(2)	
	0,2	Горох, зеленый горошек	Тли, гороховая зерновка			
	0,3	Яблоня	Яблонная плодoжорка, лис- товертки		30(1)	
	0,5-1	Виноград	Листовертки		45(1)	
	0,4-0,6	Картофель	Колорадский жук		20(2)	
	0,15-0,25	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль		30(1)	
	0,2	Рапс, горчица (кроме масла)	Рапсовый цветоед, кресто- цветные блошки		20(2)	
	0,2-0,3	Лен-долгунец	Льняные блошки	Опрыскивание всходов	-(1)	
	0,2	Свекла сахарная	Свекловичные блошки		21(1)	
			Свекловичная листовая тля	Опрыскивание в период вегетации	21(2)	
	0,25-0,3		Луговой мотылек			

1	2	3	4	5	6	7
	0,15-0,25	Подсолнечник, люцерна			28(1)	
	0,2-0,3	Кукуруза (на зерно)	Кукурузный мотылек		28(2)	
	0,5		Хлопковая совка			
	0,3	Соя	Бобовая огневка			
	0,2-0,25	Пастбища, луга, залежные земли, посевы многолетних трав и другие участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок выпаса скота - 20 дней.	20(1)	
	5 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - от 2 до 5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	30(1)	
		Виноград	Листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - от 2 до 5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)	45(1)	
	2,5 мл/100 м ² (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации.	20(2)	
		Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Расход рабочей жидкости - до 5 л/100 м ²	30(1)	
(Р) Суми-альфа, КЭ (50 г/л) Сумитомо Кемикал Агро Юроп С.А.С. 3/1 0563-07-101-186-1-1-1-1 19.02.2009	0,2-0,25	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пяденица	Опрыскивание в период вегетации	20(2)	10(4)
	0,3		Внутриветвевые мухи			
	0,2	Ячмень	Пяденица, блошки, внутриветвевые мухи		20(1)	
	0,3	Горох (кроме зеленого горошка)	Тли			
	0,5-1	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки			
	0,4-0,6	Виноград	Листовертки		45(1)	
	0,15-0,25	Картофель	Колорадский жук		20(2)	
	0,2	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль		30(1)	
	0,2-0,3	Рапс, горчица (кроме масла)	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки		20(2)	
	0,2-0,25	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок	20(1)	
	5 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход от 2 до 5 литров на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	30(1)	10(4)
		Виноград	Листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход от 2 до 5 литров на куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)	45(1)	
	2,5 мл/100м ² (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации.	20(2)	
		Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Расход рабочей жидкости - до 5 л/100м ²	30(1)	